

贵州省农业农村厅公告

第 113 号

根据《中华人民共和国种子法》《主要农作物品种审定办法》《贵州省农作物种子条例》有关规定，现对符合贵州省同一适宜生态区引种备案要求的 177 个（其中水稻 31 个、玉米 146 个）主要农作物品种予以公告。引种备案品种被原审定机构撤销审定的，备案自动撤销。

引种备案品种信息由引种者提供，引种者对引种备案数据、品种真实性、安全性和适应性负责。引种者应严格按照引种备案种植区域进行推广。

附件：2023 年通过贵州省引种备案品种信息



2023 年通过贵州省引种备案品种信息

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
1	水稻	宜优 8605	黔引种 2023 第 001 号	川审稻 20222022	宜宾市农业科学院	绵阳汉飞种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 152.7 天，比对照 F 优 498 长 2.0 天。8 个试点平均亩产 639.4 千克，比对照增产 5.28%，增产点率 75.0%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：感稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外），稻瘟病常发区慎用。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治，分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。
2	水稻	川优 8621	黔引种 2023 第 002 号	川审稻 20202004	自贡市农业科学研究所、四川省农业科学作物研究所	北京华种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 151.7 天，比对照 F 优 498 长 1.0 天。8 个试点平均亩产 618.2 千克，比对照增产 1.79%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：中感稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外）。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治，分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。
3	水稻	丝香优龙丝苗	黔引种 2023 第 003 号	桂审稻 2021073 号	广东省农业科学院水稻研究所、广西兆和种业有限公司	四川金牌农业发展有限公司	2023 年引种试验平均生育期 150.9 天，比对照 F 优 498 长 0.1 天。8 个试点平均亩产 645.2 千克，比对照增产 6.24%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：中感稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外）。	注意综合防治病虫害。苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治，分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。
4	水稻	泰优 1138	黔引种 2023 第 004 号	渝审稻 20220003	江西现代种业股份有限公司	江西现代种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 150.1 天，比对照 F 优 498 短 0.6 天。8 个试点平均亩产 644.5 千克，比对照增产 6.12%，增产点率 75.0%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：中抗稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外）。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治，分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。
5	水稻	川华优 71	黔引种 2023 第 005 号	川审稻 20220002	绵阳市农业科学研究院、四川华丰种业有限责任公司	四川华丰种业有限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 151.7 天，比对照 F 优 498 长 1 天。8 个试点平均亩产 635.3 千克，比对照 F 优 498 增产 4.61%，增产点率 75.0%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：中抗稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外），稻瘟病重发区不宜种植。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治，分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
6	水稻	青香优19香	黔引种2023第006号	川审稻20222002	四川奥力星农业科技 有限公司、广东鲜美 种苗股份有限公司、 广东省农业科学院水 稻研究所、稻道隆(广 东)生物科技有限公司	广东鲜美 种苗股份 有限公司	2023年引种试验平均生育期153.4天,比对照长2.7天。8个试点点平均亩产633.0千克,比对照F优498增产4.23%,增产点率62.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价:中感稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区(铜仁市除飞虱、螟虫防治。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治,分蘖期、孕穗期注意飞虱、螟虫防治。
7	水稻	恒两优玉占	黔引种2023第007号	川审稻20222050	四川锦秀河山农业科技 有限公司、湖南生物 机电职业技术学院、 湖南恒德种业科技 有限公司、广东省农 业科学院植物保护 研究所	湖南恒德 种业科技 有限公司	2023年引种试验平均生育期150.1天,比对照F优498早0.6天。8个试点点平均亩产610.8千克,比对照增产0.58%,增产点率37.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价:中感稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区(铜仁市除飞虱、螟虫防治。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治,分蘖期、孕穗期注意飞虱、螟虫防治。
8	水稻	千乡优臻占	黔引种2023第008号	渝审稻20230003	三明市农业科学研究所 院、四川省内江市农 业科学院、重庆国本 种业有限公司、福建 六三种业有限责任公 司	贵州黔农 开农业有 限公司	2023年引种试验平均生育期151.3天,比对照F优498长0.6天。8个试点点平均亩产653.8千克,比对照增产7.65%,增产点率87.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价:中抗稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区(铜仁市除飞虱、螟虫防治。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治,分蘖期、孕穗期注意飞虱、螟虫防治。
9	水稻	野香优雅禾	黔引种2023第009号	川审稻20222033	四川鼎盛和袖种业有 限公司、四川农业大 学、广西绿海种业有 限公司	广西绿海 种业有限 公司	2023年引种试验平均生育期149.0天,比对照F优498短1.7天。8个试点点平均亩产615.4千克,比对照增产1.34%,增产点率62.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价:中感稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区(铜仁市除飞虱、螟虫防治。	注意综合防治病虫害
10	水稻	好香优金星丝苗	黔引种2023第010号	桂审稻2022118号	广西绿海种业有限公 司	广西绿海 种业有限 公司	2023年引种试验平均生育期150.1天,比对照F优498短0.6天。8个试点点平均亩产634.1千克,比对照增产4.41%,增产点率100%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价:中抗稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区(铜仁市除飞虱、螟虫防治。	注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
11	水稻	色香优 粉丝	黔引种 2023 第 011 号	桂审稻 2022119 号	广西绿海种业有限公司	广西绿海种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 150.0 天，比对照 F 优 498 短 0.7 天。8 个试点平均亩产 626.4 千克，比对照增产 3.14%，增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：中抗稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外）。	注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。
12	水稻	野香优 818	黔引种 2023 第 012 号	桂审稻 2020106 号	广西绿海种业有限公司	广西绿海种业有限公司	2023 年引种试验生育期 148.9 天，比对照 F 优 498 短 1.9 天。8 个试点平均亩产 627.73 千克，比对照增产 3.36%，增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：中感稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外）。	注意及时预防稻瘟病、稻飞虱、稻纵卷叶螟和稻曲病等病虫害。
13	水稻	千优 9123	黔引种 2023 第 013 号	川审稻 20222029	四川福康农业科技有 限公司、四川省内江 市农业科学院	四川福康农业科技有 限公司	2023 年引种试验平均生育期 150.1 天，比对照 F 优 498 短 0.6 天。8 个试点平均亩产 650.5 千克，比对照增产 7.12%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：中抗稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外），稻瘟病重发区不宜种植。	注意病虫害防治。苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治，分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。
14	水稻	雅香优 龙丝苗	黔引种 2023 第 014 号	桂审稻 2021127 号	南宁谷源丰种业有限公司	广西壮邦种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 150.7 天，与对照 F 优 498 相当。8 个试点平均亩产 607.3 千克，比对照增产 0.01%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：中感稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外）。	注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治
15	水稻	雅香优 郁香	黔引种 2023 第 015 号	桂审稻 2021011 号	南宁谷源丰种业有限公司	广西壮邦种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 149.1 天，比对照 F 优 498 短 1.6 天。8 个试点平均亩产 615.1 千克，比对照增产 1.29%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：中抗稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外）。	注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治
16	水稻	泰丰优 2 号	黔引种 2023 第 016 号	桂审稻 2022051 号	中国水稻研究所、浙江可得丰种业有限公司	浙江可得丰种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 150.0 天，比对照 F 优 498 短 0.7 天。8 个试点平均亩产 639.5 千克，比对照增产 5.3%，增产点率 75.0%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：中感稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外）。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病、白叶枯病防治，分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
17	水稻	泰两优217	黔引种2023第017号	川审稻20222038	四川瑞禾丰农业有限公司, 浙江科原种业股份有限公司, 深圳粤香种业科技有限公司	杭州富阳金地种业公司	2023年引种试验平均生育期153.3天, 比对照长2.6天。8个试点点平均亩产632.4千克, 比对照F优498增产4.14%, 增产点率62.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价: 中感稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区(铜仁市除区外), 稻瘟病重发区不宜种植。	注意稻瘟病和其他病虫害防治。
18	水稻	宜优357	黔引种2023第018号	滇审稻2017013号	四川国豪种业股份有限公司, 绵阳市农业科学研究院, 宜宾市农业科学院	四川国豪种业股份有限公司	2022年引种试验平均生育期150.6天, 比对照F优498短0.5天。8个试点点平均亩产618.9千克, 比对照增产4.59%, 增产点率100%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价: 中抗稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区(铜仁市除区外), 稻瘟病重发区慎用。	注意加强肥水管理, 注意病虫害防治。
19	水稻	陵优6019	黔引种2023第019号	渝审稻20210005	重庆市渝东南农业科学院	贵州万胜种业有限责任公司	2022年引种试验平均生育期150.0天, 比对照F优498短5.1天。8个试点点平均亩产622.0千克, 比对照增产5.11%, 增产点率100%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价: 中感稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区(铜仁市除区外)。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治, 分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。
20	水稻	品香优稻珍	黔引种2023第020号	川审稻20212001	四川丰大种业有限公司, 四川省农业科学院水稻高粱研究所	四川丰大种业有限公司	2023年引种试验平均生育期168.2天, 比对照F优498长3.8天。安顺市平均亩产674.63千克, 比对照增产10.92%, 增产点率100%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价: 中抗稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区(铜仁市除区外), 稻瘟病重发区不宜种植。	注意防治水稻病虫害, 破口期和平穗期注意防治穗颈瘟。
21	水稻	陵香优122	黔引种2023第021号	渝审稻20220012	重庆市渝东南农业科学院	四川云海农业科技农业有限公司	2023年引种试验生育期152.6天, 比对照F优498长1.9天。8个试点点平均亩产622.8千克, 比对照增产2.56%, 增产点率62.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价: 中抗稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区(铜仁市除区外)	注意防治稻瘟病
22	水稻	锦城优5212	黔引种2023第022号	川审稻20222048	四川丰大种业有限公司, 四川农业大学、成都市农林科学院作物研究所	四川丰大种业有限公司	2023年引种试验平均生育期150.7天, 与对照F优498相当。8个试点点平均亩产634.7千克, 比对照增产4.51%, 增产点率75.0%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 中抗稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区(铜仁市除区外)。	注意防治水稻病虫害, 破口期和平穗期注意防治穗颈瘟。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
23	水稻	川优 2115	黔引种 2023 第 023 号	川审稻 20212026	四川丰大种业有限公司、四川农业大学农学院、四川省农业科学院作物研究所	四川丰大种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 166.5 天，比对照 F 优 498 长 1 天。安顺市平均亩产 632.6 千克，比对照增产 4.11%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：中抗稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外）	注意防治水稻病虫害，破口期和平穗期注意防治穗颈瘟。
24	水稻	六优 313	黔引种 2023 第 024 号	川审稻 20222034	四川农业大学水稻研究所、广西大学、广西绿海种业有限公司	广西绿海种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 150.6 天，比对照 F 优 498 短 0.1 天。8 个试点平均亩产 635.8 千克，比对照增产 4.70%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所评价：中感稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外）	注意综合防治病虫害
25	水稻	宜香优 润丝	黔引种 2023 第 025 号	渝审稻 20230008	重庆优种泰现代农业有限公司、宜宾市农业科学院、四川万德科技有限公司	重庆市盛有盛种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 150.6 天，比对照 F 优 498 短 0.1 天。8 个试点平均亩产 620.4 千克，比对照增产 2.15%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所评价：中感稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外）。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治，分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。
26	水稻	忠香优 904	黔引种 2023 第 026 号	渝审稻 20200017	重庆市渝东南农业科学院	四川天宇种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 150.6 天，比对照 F 优 498 短 0.1 天。8 个试点平均亩产 635.3 千克，比对照增产 4.62%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所评价：中抗稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外）。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治，分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。
27	水稻	忠香泰苗	黔引种 2023 第 027 号	川审稻 20206002	西科农业集团股份有限公司、贺开生	遵义农业投资（集团）农业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 154.4 天，比对照 F 优 498 早熟 4.3 天。8 个试点平均亩产 620.4 千克，比对照增产 9.46%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所评价：中感稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外），稻瘟病重发区不宜种植。	注意稻瘟病和病虫害防治，稻瘟病高发区慎用。
28	水稻	泰丰优 2115	黔引种 2023 第 028 号	川审稻 20210006	四川农业大学农学院、广东省农业科学院水稻研究所、江西现代种业股份有限公司	泸州泰丰种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 150.6 天，比对照 F 优 498 短 0.1 天，8 个试验点平均亩产 626.17kg，比对照增产 3.11%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定综合评价：中感稻瘟病。	贵州省中籼迟熟类型区（铜仁市除外），稻瘟病重发区不宜种植。	高海拔地区谨防低温危害。适时防治螟虫、飞虱、稻瘟病、纹枯病、稻曲病。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
29	水稻	乐5优177	黔引种2023第029号	川审稻2013014	乐山市农业科学研究院、四川省农业科学院作物研究所、成都金卓农业股份有限公司	成都金卓农业股份有限公司	2023年引种试验平均生育期152.6天，比对照F优498长1.9天。8个试点平均亩产646.0千克，比对照增产6.37%，增产点率87.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：中感稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区（铜仁市除外）。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治，分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。
30	水稻	吉田优华占	黔引种2023第030号	川审稻20212067	四川广富农业开发有限公司、连山壮族瑶族自治县农业科学研究所、中国水稻研究所、广东省农业科学粤良种业有限公司	四川神龙科技股份有限公司	2023年引种试验平均生育期150.7天，与对照F优498相当。8个试点平均亩产632.1千克，比对照增产4.08%，增产点率75.0%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：中感稻瘟病。	贵州省中粒迟熟类型区（铜仁市除外）。	苗期、破口期、齐穗期特别注意稻瘟病防治，分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。
31	水稻	江香优1518	黔引种2023第031号	渝审稻20220001	垫江县霸稻香水稻科学育种研究所、宜宾市农业科学院王远尾、李天银	贵州大学种业有限责任公司	2023年引种试验平均生育期150.7天，与对照F优498相当。8个试点平均亩产651.6千克，比对照增产7.3%，增产点率87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：中感稻瘟病	贵州省中粒迟熟类型区（铜仁市除外）。	注意防治稻瘟病
1	玉米	大天1880	黔引种2023第032号	滇审玉米2022111号	云南大天种业有限公司	云南大天种业有限公司	2023年引种试验平均生育期132.9天，比对照贵单8号短2.5天。8个试点平均亩产690.7千克，比对照增产1.41%，增产点率62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、大斑病、纹枯病、小斑病、南方锈病，中抗穗腐病、茎腐病、丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔1900米以上肥力土壤地区。	选择中上等肥力地块种植，避免洼地、积水地块、肥力低下的地块种植。
2	玉米	大天1588	黔引种2023第033号	滇审玉米2022114号	云南大天种业有限公司	云南大天种业有限公司	2023年引种试验平均生育期134.3天，比对照贵单8号短1.1天。8个试点平均亩产702.1千克，比对照增产3.08%，增产点率75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗灰斑病，抗大斑病，抗茎腐病，抗纹枯病，抗丝黑穗病，抗小斑病，中抗南方锈病，中抗穗腐病	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔1900米以上肥力土壤地区种植，纹枯病、锈病高发区慎用。	选择中上等肥力地块种植，避免洼地、积水地块、肥力低下的地块种植。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
3	玉米	资玉 89	黔引种 2023 第 034 号	滇审玉米 2022187 号	四川鑫万发种子科技有限公司	云南大天种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 152.9 天, 比对照西抗 18 早 3.3 天。7 个试点平均亩产 739.9 千克, 比对照增产 10.57%, 增产点率 85.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 抗纹枯病、茎腐病、小斑病、南方锈病, 中抗灰斑病、大斑病、穗腐病, 感丝黑穗病。	六盘水市、毕节市海拔 1400-2200 米中等以上肥力土壤地区, 在丝黑穗、锈病高发区慎用。	苗期防治地老虎, 大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
4	玉米	霖白 1 号	黔引种 2023 第 035 号	滇审玉米 2020108 号	云南腾丰种业有限公司	云南大天种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 134.5 天, 比对照贵单 8 号短 0.9 天。8 个试点平均亩产 707.95 千克, 比对照增产 3.94%, 增产点率 75.0%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗灰斑病、茎腐病, 抗纹枯病、丝黑穗病、小斑病、大斑病, 中抗南方锈病、穗腐病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	选择中上等肥力地块种植, 避免洼地、积水地块、肥力低下的地块种植。
5	玉米	大好 1799	黔引种 2023 第 036 号	滇审玉米 2022106 号	云南大天种业有限公司	云南大天种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 131.9 天, 比对照贵单 8 号短 3.5 天。8 个试点平均亩产 681.83 千克, 比对照增产 0.1%, 增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 抗灰斑病、穗腐病、小斑病、南方锈病, 中抗大斑病、茎腐病、纹枯病、丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植, 锈病高发区慎用。	播种过程中请选择中上等肥力地块种植, 避免洼地、积水地块、肥力低下的地块种植。
6	玉米	大天 994	黔引种 2023 第 037 号	滇审玉米 2022104 号	云南大天种业有限公司	云南大天种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 132.8 天, 比对照贵单 8 号短 2.6 天。8 个试点平均亩产 707.89 千克, 比对照增产 3.93%, 增产点率 75.0%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 抗灰斑病、小斑病、南方锈病, 中抗大斑病、穗腐病、茎腐病、纹枯病, 感丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植, 在丝黑穗、锈病高发区慎用。	苗期防治地老虎, 大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
7	玉米	大天 2248	黔引种 2023 第 038 号	滇审玉米 2022105 号	云南大天种业有限公 司	云南大天种业有限 公司	2023 年引种试验平均生育期 132.9 天，比对照贵单 8 号短 2.5 天。8 个试点平均亩产 694.9 千克，比对照增产 2.03%，增产点率 75.0%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗灰斑病，抗大斑病、穗腐病、纹枯病、小斑病、南方锈病，中抗茎腐病，感丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植，在丝黑穗、锈病、纹枯病高发区慎用。	苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
8	玉米	大天 6083	黔引种 2023 第 039 号	滇审玉米 2022108 号	云南大天种业有限公 司	云南大天种业有限 公司	2023 年引种试验平均生育期 134.1 天，比对照贵单 8 号短 1.3 天。8 个试点平均亩产 685.1 千克，比对照增产 0.58%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗小斑病，抗纹枯病，中抗灰斑病、大斑病、穗腐病、茎腐病、南方锈病，感丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植，在丝黑穗、锈病高发区慎用。	苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
9	玉米	大天 318	黔引种 2023 第 040 号	滇审玉米 2022110 号	云南大天种业有限公 司	云南大天种业有限 公司	2023 年引种试验平均生育期 132.8 天，比对照贵单 8 号短 2.6 天。8 个试点平均亩产 695.32 千克，比对照增产 2.09%，增产点率 62.5%。所	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗茎腐病、纹枯病、灰斑病、大斑病、小斑病，中抗南方锈病、穗腐病，感丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植，在丝黑穗病、锈病、纹枯病高发区慎用。	苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
10	玉米	大天 969	黔引种 2023 第 041 号	滇审玉米 2022112 号	云南大天种业有限公 司	云南大天种业有限 公司	2023 年引种试验平均生育期 133.1 天，比对照贵单 8 号短 2.3 天。8 个试点平均亩产 699.9 千克，比对照增产 2.75%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗灰斑病，抗茎腐病、纹枯病、小斑病，中抗南方锈病、大斑病、穗腐病，感丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植，在丝黑穗病高发区慎用。	苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
11	玉米	大天 2302	黔引种 2023 第 042 号	滇审玉米 2021127 号	云南大天种业有限公司	云南大天种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 132.4 天，比对照贵单 8 号短 3.0 天。8 个试点平均亩产 693.1 千克，比对照增产 1.76%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、大斑病、小斑病、南方锈病，中抗穗腐病、茎腐病、纹枯病，感丝黑穗病。	贵阳市、黔东南市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植，在丝黑穗、锈病、纹枯病重发区慎用。	苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
12	玉米	盛和 005	黔引种 2023 第 043 号	滇审玉米 2022115 号	云南大天种业有限公司	云南大天种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 130.6 天，比对照贵单 8 号短 4.8 天。8 个试点平均亩产 686.5 千克，比对照增产 0.79%，增产点率 75.0%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、纹枯病、小斑病、南方锈病，中抗大斑病、穗腐病、茎腐病、丝黑穗病。	贵阳市、黔东南市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植，在锈病重发区慎用。	播种过程中请选择中上等肥力地块种植，避免洼地、积水地块、肥力低下的地块种植。
13	玉米	罗单 922	黔引种 2023 第 044 号	滇审玉米 2022113 号	云南大天种业有限公司	云南大天种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 128.6 天，比对照贵单 8 号短 6.8 天。8 个试点平均亩产 694.1 千克，比对照增产 1.91%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、大斑病、纹枯病、小斑病、南方锈病，中抗穗腐病、茎腐病，感丝黑穗病。	贵阳市、黔东南市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植，在丝黑穗病重发区慎用。	苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
14	玉米	满玉 1 号	黔引种 2023 第 045 号	川审玉 20212031	成都金卓农业股份有限公司、四川赤诚三农种业有限公司、大竹县益民玉米研究所、四川四季丰农业开发有限公司	四川奥力农业科技公	2023 年引种试验平均生育期 126 天，比对照新中玉 801 晚 0.1 天。8 个试点平均亩产 564.5 千克，比对照增产 4.16%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病，中抗灰斑病、穗腐病、丝黑穗病、纹枯病，抗大斑病、小斑病、南方锈病。	贵阳市、遵义市、黔东南市、安顺市、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以上中等以上肥力土壤地区。	苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
15	玉米	凉单 12 号	黔引种 2023 第 046 号	川审玉 20202004	凉山州西昌农业科学研究所	四川奥力星农业科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 126.4 天, 比对照新中玉 801 晚 0.5 天。8 个试点平均亩产 598.9 千克, 比对照增产 10.51%, 增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗丝黑穗病, 抗茎腐病、灰斑病、纹枯病、小斑病, 中抗大斑病、穗腐病、南方锈病。	贵阳市、遵义市、黔东南州、黔南州、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以下中等以上肥力土壤地区。	苗期防治地老虎, 大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
16	玉米	康玉 448	黔引种 2023 第 047 号	川审玉 20212071	甘孜藏族自治州农业科学研究所、四川奥力星农业科技有限公司	四川奥力星农业科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 132.4 天, 比对照贵单 8 号长 1.8 天。8 个试点平均亩产 671.3 千克, 比对照增产 5.79%, 增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗茎腐病, 抗纹枯病、小斑病、南方锈病, 中抗灰斑病、大斑病、穗腐病, 感丝黑穗病。	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植, 在丝黑穗病重发区慎用。	苗期防治地老虎, 大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
17	玉米	诚玉 799	黔引种 2023 第 048 号	川审玉 20222048	四川华龙种业有限责任公司、广西壮族农业科学院玉米研究所	四川奥力星农业科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 132.3 天, 比对照贵单 8 号长 1.6 天。8 个试点平均亩产 671.9 千克, 比对照增产 5.88%, 增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗茎腐病, 抗纹枯病、小斑病、南方锈病、灰斑病, 中抗大斑病、穗腐病, 感丝黑穗病。	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植, 在丝黑穗病重发区慎用。	苗期防治地老虎, 大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
18	玉米	鼎创 666	黔引种 2023 第 049 号	川审玉 20212047	四川熟地种业有限责任公司	四川熟地种业有限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 125.1 天, 比对照新中玉 801 早 0.8 天。8 个试点平均亩产 608.2 千克, 比对照增产 12.22%, 增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗丝黑穗病, 抗茎腐病、纹枯病、小斑病、南方锈病, 中抗大斑病、穗腐病, 感灰斑病。	贵阳市、遵义市、黔东南州、黔南州、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以下中等以上肥力土壤地区种植, 在灰斑病重发地区慎用。	注意苗期防止地老虎, 大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
19	玉米	金谷8号	黔引种 2023 第050号	滇审玉米 2022209号	弥勒市金谷种子有限公司	云南金粒种子有限公司	2023年引种试验：平均生育期154.3天，比对照西抗18早熟1.9天。7个试点平均亩产705.3千克，比对照增产5.49%，增产点率85.7%。所有试点未发生倒伏，综合抗病性较强。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗小斑病、灰斑病、茎腐病、南方锈病，中抗大斑病、玉米纹枯病、穗病，感丝黑穗病。	六盘水市、毕节市海拔1400-2200米中等以上肥力土壤地区。	播种前注意防治地下害虫，出苗后注意防治病、虫、草、鼠危害。
20	玉米	红花玉景	黔引种 2023 第051号	湘审玉 20230009	南京理想农业科技有 限公司	南京理想农业科技有 限公司	2023年引种试验平均年生育期98.6天，比对照黔糯868短1.1天，7个试点平均亩产708.9千克，比对照减产0.03%，增产点率57.1%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗小斑病、纹枯病、南方锈病，中抗穗腐病、灰斑病，感丝黑穗病，高感大斑病和茎腐病。	贵州省鲜食玉米区种植，在大斑病和茎腐病重发区慎用。	合理密植，注意防治病虫害。
21	玉米	白甜糯 玉景	黔引种 2023 第052号	湘审玉 20230008	南京理想农业科技有 限公司	南京理想农业科技有 限公司	2023年引种试验平均年生育期97.0天，比对照黔糯868短2.7天，7个试点平均亩产723.9千克，比对照增产2.08%，增产点率85.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗纹枯病、小斑病、南方锈病，中抗灰斑病、穗腐病，高感大斑病、茎腐病和丝黑穗病。	贵州省鲜食玉米区种植，在大斑病、茎腐病和丝黑穗病重发区慎用。	合理密植，注意防治病虫害。
22	玉米	先玉1895	黔引种 2023 第053号	湘审玉 20220003	铁岭先锋种子研究有 限公司	山东登海种业先 锋种业有限公司	2023年引种试验平均生育期124.6天，比对照新中玉801早1.3天。8个试点平均亩产591.4千克，比对照增产9.11%，增产点率87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗纹枯病、小斑病和南方锈病，中抗灰斑病、大斑病、穗腐病和茎腐病，感丝黑穗病。	贵阳市、遵义市、黔东南州、黔南州、铜仁市、金沙县海拔1500米以上中等以上肥力土壤地区种植，在丝黑穗病重发区慎用。	应根据当地病虫害预测预报情况及时防治病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
23	玉米	强德 819	黔引种 2023 第 054 号	滇审玉米 2022007 号	云南强德农业科技有 限公司	云南绿晶 种业有限 公司	2022 年引种试验平均生育期 132.5 天，比对照贵单 8 号短 1.9 天。8 个试点平均亩产 656.3 千克，比对照增产 4.68%，增 产点率 87.5%。	经贵州省植物保 护研究所鉴定：高 抗丝黑穗病，抗纹 枯病、小斑病、南 方锈病、大斑病， 中抗穗腐病、灰斑 病。	贵阳市、黔西南 州、安顺市、毕 节市、六盘水市海拔 1900 米以上中等 肥力土壤地区。	注意防治纹枯病，纹枯 病高发区慎用。
24	玉米	桂农 9672	黔引种 2023 第 055 号	桂审玉 2022081 号	广西桂农正达科技开 发有限公司	广西博士有 限公司	2023 年引种试验平均生育期 112.8 天，比对照正大 808 长 0.7 天。6 个试点平均亩产 542.42 千克，比对照增产 2.69%，增产点率 66.7%。	经贵州省植物保 护研究所鉴定：高 抗茎腐病和南方 锈病、抗小斑病和 纹枯病、中抗灰斑 病、丝黑穗病、大 斑病和穗腐病。	贵州省三都县、荔 波县、独山县、平 塘县、罗甸县、安 顺县、册亨县、兴 义市、贞丰县、镇 宁县、紫云县、海 800 米以下低热河 谷区中等以上肥 力土壤地区。	注意及时防治大斑病、 小斑病等病虫害。
25	玉米	庆农 5913	黔引种 2023 第 056 号	桂审玉 2022080 号	广西博士园种业有限 公司	广西博士有 限公司	2023 年引种试验平均生育期 114.7 天，比对照正大 808 长 1.2 天。6 个试点平均亩产 586.7 千克，比对照增产 11.08%， 增产点率 100%。	经贵州省植物保 护研究所鉴定：高 抗茎腐病，抗丝黑 穗病、小斑病和南 方锈病，中抗灰斑 病、大斑病、穗腐 病和纹枯病。	贵州省三都县、荔 波县、独山县、平 塘县、罗甸县、安 顺县、册亨县、兴 义市、贞丰县、镇 宁县、紫云县、海 800 米以下低热河 谷区中等以上肥 力土壤地区。	注意及时防治大斑病 等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
26	玉米	千单7号	黔引种 2023 第057号	川审玉 20222058	四川创世嘉农业科技 有限公司、四川农业 大学玉米研究所	四川创世嘉农业科技 有限公司	2023年引种试验平均生育期128.4天，比对照贵单8号短7.0天。8个试点平均亩产684.2千克，比对照增产0.46%，增产点率75.0%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病，抗灰斑病、小斑病，中抗大斑病、穗腐病、纹枯病、丝黑穗病、南方锈病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔1900米以下中等肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
27	玉米	金格玉 807	黔引种 2023 第058号	滇审玉米 20222096号	云南中禾种业有限公司	云南中禾种业有限公司	2023年引种试验平均生育期133.1天，比对照贵单8号长2.5天。8个试点平均亩产681.1千克，比对照增产7.32%，增产点率100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病，抗灰斑病、小斑病、纹枯病和南方锈病，中抗穗腐、大斑病，感丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔1900米以下中等以上肥力土壤地区种植，在丝黑穗病重发区慎用。	注意苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
28	玉米	禾圣669	黔引种 2023 第059号	滇审玉米 20222089号	云南中禾种业有限公司	云南中禾种业有限公司	2023年引种试验平均生育期132天，比对照贵单8号长1.38天。8个试点平均亩产680.8千克，比对照增产7.28%，增产点率87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗灰斑病，抗小斑病和南方锈病，中抗穗腐、茎腐病、大斑病，感丝黑穗病和纹枯病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔1900米以下中等以上肥力土壤地区种植，在纹枯病、丝黑穗病重发区慎用。	注意苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
29	玉米	云墨99	黔引种 2023 第060号	滇审玉米 2020015号	镇雄县丰源种业有限公司、云南瑞禾种业有限公司	云南瑞禾种业有限公司	2023年引种试验平均生育期132.1天，比对照贵单8号短1.5天。8个试点平均亩产649.0千克，比对照增产2.27%，增产点率75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗小斑病，中抗灰斑病、穗腐病、纹枯病和南方锈病，感大斑病、茎腐病和丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市1900米以下中等以上肥力地区种植，在大斑病、茎腐病和丝黑穗病重发区慎用。	注意苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
30	玉米	正昊玉833	黔引种2023第061号	桂审玉2021004号	南宁市正昊农业科学研究院、广西青青农业科技有限公司	广西青青农业科技有限公司	2023年引种试验平均生育期124.3天，比对照新中玉801早1.6天。8个试点平均亩产597.1千克，比对照增产10.17%，增产点率87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、大斑病、茎腐病、小斑病和南方锈病，中抗穗腐病、纹枯病和丝黑穗病。	贵阳市、遵义市、黔东南州、黔南州、铜仁市、金沙县海拔1500米以上肥力中等以上壤地区。	注意苗期防止地老虎，全生育期防治草地贪夜蛾、玉米螟等病虫害。
31	玉米	玉都68	黔引种2023第062号	滇审玉米2022059号	云南宣丰农业科技有	云南宣丰农业科技有限公司	2023年引种试验平均生育期154.9天，比对照西抗18早1.3天。7个试点平均亩产690.9千克，比对照增产3.26%，增产点率71.4%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗穗腐病，抗纹枯病、丝黑穗病、小斑病和南方锈病，中抗灰斑病、大斑病和茎腐病。	六盘水市、毕节市海拔1400-2200米以上肥力中等以上壤地区。	注意防治锈病。虫害防治同一般品种的防治方法。
32	玉米	胜玉207	黔引种2023第063号	滇审玉米2021202号	富源县胜玉种业有限公司	富源县胜玉种业有限公司	2023年引种试验平均生育期129.4天，比对照贵单8号短1.3天。8个试点平均亩产711.5千克，比对照增产9.65%，增产点率87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗茎腐病、纹枯病、小斑病、南方锈病，中抗灰斑病、大斑病、穗腐病，感丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市1900米以上中等以上肥力地区种植，在丝黑穗病重发区慎用。	在锈病和纹枯病高发区慎用。
33	玉米	万甜糯1号	黔引种2023第064号	川审玉20223002	四川省农科院生物技术研究所、四川万德科技有限公司	四川万德科技有限公司	2023年引种试验平均生育期97.1天，比对照黔糯868短2.6天。7个试点平均亩产771.7千克，比对照增产8.82%，增产点率85.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗小斑病、灰斑病和茎腐病，中抗穗腐病、纹枯病和南方锈病，感黑穗病，高感大斑病。	贵州省鲜食玉米种植区，在大斑病重发区慎用。	注意防治病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
34	玉米	华单 518	黔引种 2023 第 065 号	川审玉 20222022	四川华龙种业有限责任公司、临泽县绿润种业有限公司	四川万德农业科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 124.6 天，比对照新中玉 801 短 1.3 天。8 个试点平均亩产 551.2 千克，比对照增产 1.71%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病，抗大斑病、小斑病和灰斑病，中抗穗腐病、纹枯病和丝黑穗病，感南方锈病。	贵阳市、遵义市、黔东南州、黔南州、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以下中等以上肥力土壤地区种植。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
35	玉米	定单 3 号	黔引种 2023 第 066 号	滇审玉米 20222097 号	云南柏启生物科技有限公司	云南柏启生物科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 129.0 天，比对照贵单 8 号短 1.6 天。8 个试点平均亩产 657.9 千克，比对照增产 3.66%，增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗小斑病、南方锈病、丝黑穗病、纹枯病和茎腐病，中抗大斑病、灰斑病和穗腐病。	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意防治病虫害。
36	玉米	一丰 26	黔引种 2023 第 067 号	川审玉 20222047	四川一丰种业有限责任公司、四川农业大学玉米所	四川一丰种业有限责任公司	2022 年引种试验平均生育期 134.1 天，比对照贵单 8 号短 1.1 天。8 个试点平均亩产 678.3 千克，比对照贵单 8 号增产 6.54%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、丝黑穗病、小斑病和南方锈病，中抗大斑病、穗腐病、茎腐病和纹枯病。	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	加强对病中害的防治，在出现灾害时，应积极采取对策和措施，做好防灾减灾工作。
37	玉米	成单 319	黔引种 2023 第 068 号	川审玉 20230007	四川省农业科学院作物研究所	四川一丰种业有限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 125.0 天，与对照新中玉 801 相当。8 个试点平均亩产 560.5 千克，比对照增产 3.42%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、大斑病、茎腐病、纹枯病和小斑病，中抗穗腐病和南方锈病，感丝黑穗病。	贵阳市、遵义市、黔东南州、黔南州、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以下中等以上肥力土壤地区种植，在丝黑穗病重发区慎用。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
38	玉米	滨甜9号	黔引种2023第069号	桂审玉2021023号	朱斌	广西皓凯生物科技有限公司	2022年引种试验平均生育期98.0天,比对照黔糯868短4.9天。7个试点平均亩产767.6千克,比对照增产0.33%,增产点率71.4%。	经贵州省植物保护研究所鉴定:高抗纹枯病和丝黑穗病,抗灰斑病、小斑病和南方锈病,感大斑病。	贵州省鲜食玉米种植区。	要做好与普通玉米隔离种植;注意防治大斑病、小斑病、灰斑病和纹枯病,以免减产;在抽穗期注意防治蚜虫和螟虫;授粉扬花期间遇阴雨天气,做好人工辅助授粉。
39	玉米	真大2号	黔引种2023第070号	桂审玉2022006号	南宁真福种业有限公司	广西皓凯生物科技有限公司	2023年引种试验平均生育期115.5天,比对照正大808长2.0天。6个试点平均亩产540.5千克,比对照增产2.32%,增产点率66.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定:抗灰斑病、纹枯病和小斑病,中抗大斑病、穗腐病、茎腐病和南方锈病,感丝黑穗病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、塘县、罗甸县、望谟县、册亨县、龙县、贞丰县、义市、紫云县、宁县、关岭县海拔800米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区种植,在丝黑穗病重发区慎用。	注意防治丝黑穗病,苗期防治地老虎,大喇叭口期防治玉米螟,成熟后及时收获、脱粒、晾干存储。
40	玉米	金香甜糯228	黔引种2023第071号	桂审玉2020052号	广西南宁金农种子有限公司、广西皓凯生物科技有限公司	广西皓凯生物科技有限公司	2023年引种试验平均生育期98.4天,比对照黔糯868短1.3天。7个试点平均亩产735.5千克,比对照增产3.72%,增产点率100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定:抗小斑病,中抗灰斑病、大斑病、茎腐病、纹枯病和南方锈病,感穗腐病和丝黑穗病。	贵州省鲜食玉米种植区。	要做好与普通玉米隔离种植;注意防治大斑病、小斑病、灰斑病和纹枯病,以免减产;在抽穗期注意防治蚜虫和螟虫;授粉扬花期间遇阴雨天气,做好人工辅助授粉。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
41	玉米	DS183	黔引种 2023 第 072 号	川审玉 20216005	广西兆和种业有限公司、四川奥力星农业科技有限公司	张掖市业有公 东种业有限 张亚种业有 限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 125.6 天，比对照新中玉 801 早 0.3 天。8 个试点平均亩产 591.1 千克，比对照增产 9.07%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、大斑病、茎腐病、小斑病和南方锈病，中抗穗腐病、纹枯病和丝黑穗病。	贵阳市、遵义市、铜仁市、黔南州、黔东南州和金沙县海拔 1500 米以下的中上等肥力土壤地区。	宜春播，苗期注意蹲苗，防止倒伏，适时早收，注意防治纹枯病、丝黑穗病和玉米螟。
42	玉米	万德 3388	黔引种 2023 第 073 号	川审玉 20222044	四川省农业科学院生物技术与研究所、四川万德科技有限公司	四川田丰农业科技 发展有限公 司	2023 年引种试验平均生育期 131.3 天，比对照贵单 8 号长 0.6 天。8 个试点平均亩产 675.0 千克，比对照增产 4.04%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗大斑病、小斑病，中抗灰斑病、茎腐病、纹枯病、丝黑穗病、南方锈病，感穗腐病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植，在穗腐病重发区慎用。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
43	玉米	恩惠单 1 号	黔引种 2023 第 074 号	鄂审玉 20200012	恩施土家族苗族自治州农业科学院、华中农业大学	四川田丰农业科技 发展有限公 司	2023 年引种试验平均生育期 131.3 天，比对照贵单 8 号长 0.6 天。8 个试点平均亩产 675.0 千克，比对照增产 4.04%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗丝黑穗病，抗茎腐病、小斑病、南方锈病，中抗灰斑病、大斑病、穗腐病，感纹枯病	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
44	玉米	恩单 532	黔引种 2023 第 075 号	鄂审玉 2016006	恩施土家族苗族自治州农业科学院	四川禾创 种业有限公 司	2023 年引种试验平均生育期 132 天，比对照贵单 8 号长 1.4 天。8 个试点平均亩产 664.5 千克，比对照增产 2.41%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗灰斑病，抗茎腐病、纹枯病、小斑病和南方锈病，中抗大斑病、穗腐病和丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
45	玉米	田丰 998	黔引种 2023 第 076 号	川审玉 20222038	四川田丰农业科技开发有限公司、绵阳汉飞种业股份有限公司、四川禾创种业有限公司	四川田丰农业科技开发有限公司	2023 年引种试验平均生育期 125.6 天，比对照新中玉 801 早 0.3 天。8 个试点平均亩产 577.5 千克，比对照增产 6.56%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、大斑病、纹枯病、小斑病和南方锈病，中抗穗腐病、茎腐病和丝黑穗病。	贵阳市、遵义市、铜仁市、黔南州、黔东南州和金沙县海拔 1500 米以下的中上等肥力土壤地区。	宜春播，苗期注意蹲苗，防止倒伏，适时早收，注意防治纹枯病、丝黑穗病和玉米螟。
46	玉米	恩单 519	黔引种 2023 第 077 号	鄂审玉 20200014	恩施土家族苗族自治州农业科学院、华中农业大学	四川福康农业科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 132.5 天，比对照贵单 8 号长 1.9 天。8 个试点平均亩产 677.8 千克，比对照增产 4.47%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗丝黑穗病，抗灰斑病、茎腐病、纹枯病、小斑病和南方锈病，中抗大斑病、穗腐病。	贵阳市、黔西市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
47	玉米	互邦 107	黔引种 2023 第 078 号	川审玉 20222028	四川省嘉陵农作物种业研究有限公司	四川福康农业科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 125.3 天，比对照新中玉 801 早 0.6 天。8 个试点平均亩产 585.4 千克，比对照增产 8.02%，增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗南方锈病，抗灰斑病、大斑病、丝黑穗病和小斑病，中抗穗腐病、茎腐病、纹枯病。	贵阳市、遵义市、铜仁市、黔南州、黔东南州和金沙县海拔 1500 米以下的中上等肥力土壤地区。	宜春播，苗期注意蹲苗，防止倒伏，适时早收，注意防治纹枯病、丝黑穗病和玉米螟。
48	玉米	河糯 136	黔引种 2023 第 079 号	桂审玉 2018026 号	河池市农业科学研究所、广西农业科学院桂西分院	广西皓凯生物科技有限公司	2022 年引种试验平均生育期 101.1 天，比对照黔糯 868 短 2.0 天。7 个试点平均亩产 772.7 千克，比对照增产 0.3%，增产点率 71.4%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗小斑病、灰斑病、南方锈病，中抗纹枯病、大斑病、丝黑穗病，感穗腐病。	贵州省鲜食玉米种植区。	要做好与普通玉米隔离种植；注意防治大斑病、小斑病、灰斑病和纹枯病，以免减产；在抽穗期注意防治蚜虫和螟虫；授粉扬花期间遇阴雨天气，做好人工辅助授粉。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
49	玉米	金苹果 669	黔引种 2023 第 080 号	滇审玉米 20222004 号	武威金苹果农业股份有限公司	武威金苹果股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 130.8 天，比对照贵单 8 号长 0.1 天。8 个试点平均亩产 668.3 千克，比对照增产 3%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗灰斑病、丝黑穗病、南方锈病、中抗大斑病、穗腐病、茎腐病、纹枯病，感小斑病。	贵阳市、黔东南市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	加强田间管理，及时中耕除草，抗旱防涝，大喇叭口期应注意防治玉米螟。
50	玉米	楚玉 109	黔引种 2023 第 081 号	桂审玉 20222050 号	垦丰长江种业科技有限公司、西昌垦丰农业科技有限公司	四川垦丰有限公司	2023 年引种试验平均生育期 114.3 天，比对照正大 808 长 0.2 天。6 个试点平均亩产 560.5 千克，比对照增产 6.12%，增产点率 66.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗灰斑病、中抗灰斑病、抗穗腐病、大斑病，抗茎腐病、小斑病、南方锈病，感玉米纹枯病、丝黑穗病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、平塘县、罗甸县、望谟县、册亨县、安龙县、贞丰县、兴义市、紫云县、镇宁县、关岭县海拔 800 以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。	纹枯病、丝黑穗病重发区慎用。
51	玉米	楚玉 518	黔引种 2023 第 082 号	桂审玉 20222051 号	垦丰长江种业科技有限公司、西昌垦丰农业科技有限公司	四川垦丰有限公司	2023 年引种试验平均生育期 111.8 天，比对照正大 808 短 1.7 天。6 个试点平均亩产 558.5 千克，比对照增产 5.73%，增产点率 66.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗锈小斑病和南方锈病，中抗灰斑病、穗腐病和茎腐病，感大斑病、纹枯病和丝黑穗病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、平塘县、罗甸县、望谟县、册亨县、安龙县、贞丰县、兴义市、紫云县、镇宁县、关岭县海拔 800 以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。	注意防治大斑病、纹枯病、丝黑穗病。
52	玉米	万禾 539	黔引种 2023 第 083 号	桂审玉 2019078 号	南宁市皓凯农作物研究所、广西万禾种业有限公司	四川垦丰有限公司	2023 年引种试验平均生育期 124.9 天，比对照新中玉 801 早 1 天。8 个试点平均亩产 549.6 千克，比对照增产 1.41%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗灰斑病，抗灰斑病、丝黑穗病、小斑病，中抗大斑病、穗腐病、南方锈病和纹枯病。	贵阳市、遵义市、黔东南市、黔南州、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以上中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
53	玉米	恩丰单1号	黔引种2023第084号	鄂审玉20200013	恩施土家族苗族自治州农业科学院	四川垦丰种业有限公司	2023年引种试验平均生育期135.5天,比对照贵单8号长4.9天。8个试点平均亩产734.4千克,比对照增产13.19%,增产点率87.5%。	贵州省植物保护研究所鉴定:高抗茎腐病,抗小斑病、灰斑病、南方锈病,中抗大斑病、穗腐病、玉米纹枯病,感丝丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔1900以下中等以上肥力土壤地区种植,在丝丝黑穗病重发区慎用。	注意苗期防止地老虎,大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
54	玉米	云瑞16	黔引种2023第085号	滇审玉米2022051号	云南省农业科学院粮食作物研究所	北京联创种业公司	2023年引种试验平均生育期129.6天,比对照贵单8号短5.8天。8个试点平均亩产698.5千克,比对照增产2.55%,增产点率62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定:高抗茎腐病,抗大斑病、纹枯病和丝丝黑穗病,中抗灰斑病、穗腐病和南方锈病,感小斑病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔1900米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎,大喇叭口期防治玉米螟等病虫害;小斑病高发区注意防治。
55	玉米	壮美玉9号	黔引种2023第086号	桂审玉2021073号	广西桂种业有限公司、南充职业技术学院	广西桂种业有限公司	2023年引种试验平均生育期113.3天,比对照正大808短0.2天。6个试点平均亩产553.2千克,比对照增产4.73%,增产点率66.7%。	贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价:高抗纹枯病和茎腐病,抗灰斑病、小斑病和南方锈病,中抗大斑病和穗腐病,感丝丝黑穗病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、平塘县、罗甸县、望谟县、册亨县、龙县、贞丰县、义龙镇、紫云县、关岭县海拔800米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。	注意防治丝丝黑穗病,苗期防治地老虎,大喇叭口期防治玉米螟,成熟后及时收获、脱粒、晾干存贮。
56	玉米	早甜加糯999	黔引种2023第087号	桂审玉2022110号	湛江金灿灿现代农业发展有限公司、广西万禾种业有限公司	四川金牌农业发展有限公司	2023年引种试验平均生育期96.3天,比对照黔糯868短3.4天。7个试点平均亩产783.9千克,比对照增产10.55%,增产点率100.0%。	经贵州省植物保护研究所鉴定:抗灰斑病、小斑病、南方锈病,中抗茎腐病、纹枯病、丝丝黑穗病,高感大斑病、穗腐病。	贵州省鲜食玉米区种植,在大斑病、穗腐病重发区慎用。	播种时间应避开低温寒潮,成熟及时收获。综合防治病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
60	玉米	显玉 808	黔引种 2023 第 091 号	桂审玉 2022066 号	玉林市农业科学院、四川兆和种业有限公司	四川金展牌农业发展有限公司	2023 年引种试验平均生育期 113.8 天，比对照正大 808 长 0.3 天。6 个试点平均亩产 593.8 千克，比对照增产 12.42%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、小斑病和南方锈病，中抗大斑病、穗腐病、茎腐病和纹枯病，感丝黑穗病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、塘县、罗甸县、望谟县、册亨县、龙县、贞丰县、义龙县、紫云县、兴义市、关岭县、镇宁县、关岭县、海拨 800 米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区种植，在丝黑穗病重发区慎用。	注意南方锈病、大斑病等病虫害综合防治。
61	玉米	金硕 888	黔引种 2023 第 092 号	桂审玉 2022068 号	四川金展牌农业发展有限公司、广西万禾种业有限责任公司	四川金展牌农业发展有限公司	2023 年东部引种试验平均生育期 124.5 天，比对照新中玉 801 短 1.4 天。8 个试点平均亩产 589.6 千克，比对照增产 8.78%，增产点率 62.5%。2023 年低热河谷引种试验平均生育期 111.8 天，比对照正大 808 短 1.7 天。6 个试点平均亩产 556.5 千克，比对照增产 5.35%，增产点率 66.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、大斑病、丝黑穗病、小斑病、南方锈病，中抗穗腐病、茎腐病和纹枯病。	贵阳市、遵义市、黔东南州、黔南州、铜仁市、金沙县、海拨 1500 米以下和望谟县、册亨县、安龙县、贞丰县、兴义市、紫云县、镇宁县、关岭县、海拨 800 米以下低热河谷区的中等以上肥力土壤地区。	注意综合防治病虫害。
62	玉米	壮玉 909	黔引种 2023 第 093 号	川审玉 20216008	广西兆和种业有限责任公司、四川兆和种业有限责任公司、四川金种子农业科技有限责任公司、云南显玉种业有限责任公司	四川金展牌农业发展有限公司	2023 年引种试验平均生育期 124.9 天，比对照新中玉 801 短 1.0 天。8 个试点平均亩产 568.6 千克，比对照增产 4.91%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗丝黑穗病、小斑病、灰斑病，抗大斑病、南方锈病，中抗纹枯病和穗腐病。	贵阳市、遵义市、黔东南州、黔南州、铜仁市、金沙县、海拨 1500 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意综合防治病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
63	玉米	兆康 777	黔引种 2023 第 094 号	川审玉 20216009	广西兆和种业有限公司、四川兆和种业有限公司	四川金牌农业发展有限公司	2023 年引种试验平均生育期 124.6 天，比对照新中玉 801 短 1.3 天。8 个试点平均亩产 555.7 千克，比对照增产 2.52%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗丝黑穗病、小斑病和南方锈病，抗纹枯病和大斑病，中抗穗腐病和灰斑病。	贵阳市、遵义市、黔东南州、黔南州、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意综合防治病虫害。
64	玉米	蓉彩 265	黔引种 2023 第 095 号	川审玉 20220029	仲衍种业股份有限公司	仲衍种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 97.6 天，比对照黔糯 868 短 2.1 天。7 个试点平均亩产 778.5 千克，比对照增产 9.78%，增产点率 85.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗小斑病，中抗灰斑病、丝黑穗病、南方锈病和纹枯病，高感大斑病、茎腐病和穗腐病。	贵州省鲜食玉米区种植，在大斑病、茎腐病和穗腐重发区慎用。	必须先试验成功后推广。连续多日 35℃ 以上高温干燥或 12℃ 以下低温多雨气候，易造成缺粒、秃尖等现象。适时播种，避免造成损失。注意预防心叶期玉米螟为害和花粒期果穗虫害，综合防治病虫害。
65	玉米	南甜糯 601	黔引种 2023 第 096 号	渝审玉 20220029	南京永立农业发展有限公司	仲衍种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 97.0 天，比对照黔糯 868 短 2.7 天。7 个试点平均亩产 757.9 千克，比对照增产 6.88%，增产点率 71.4%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗小斑病，中抗灰斑病、南方锈病和纹枯病，感茎腐病和丝黑穗病，高感大斑病和穗腐病。	贵州省鲜食玉米区种植，在大斑病和穗腐重发区慎用。	注意预防心叶期玉米螟为害和花粒期果穗虫害，综合防治病虫害。
66	玉米	金牛玉 999	黔引种 2023 第 097 号	川审玉 20212078	四川辐苗农业科技有限公司、井研县禾润盈丰农业科技研究所、四川盈丰种业有限公司	四川盈丰种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 133.6 天，比对照贵单 8 号短 1.8 天。8 个试点平均亩产 731.4 千克，比对照增产 7.38%，增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、大斑病、小斑病、丝黑穗病和南方锈病，中抗穗腐病和纹枯病。	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
67	玉米	霖玉 1339	黔引种 2023 第 098 号	滇审玉米 2019237 号	云南霖鹏农业科技有限公司	四川农业高科技有限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 131.6 天, 比对照贵单 8 号短 3.8 天。8 个试点平均亩产 764.7 千克, 比对照增产 12.26%, 增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 抗灰斑病、玉米纹枯病、小斑病, 中抗大斑病、穗腐病、茎腐病、丝黑穗病和南方锈病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎、大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
68	玉米	明玉 9686	黔引种 2023 第 099 号	滇审玉米 2022016 号	云南明晖麒圣实业有限公司	贵州吉丰种业有限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 135.9 天, 比对照贵单 8 号长 1.9 天。8 个试点平均亩产 659.9 千克, 比对照增产 8.1%, 增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗灰斑病和丝黑穗病, 抗大斑病、茎腐病和小斑病, 中抗穗腐病、玉米纹枯病和南方锈病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎、大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
69	玉米	云良 8 号	黔引种 2023 第 100 号	滇审玉米 2020082 号	云南储泉种业有限公司	贵州吉丰种业有限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 133.4 天, 比对照贵单 8 号长 0.6 天。8 个试点平均亩产 667.8 千克, 比对照增产 9.3%, 增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 抗灰斑病、纹枯病、小斑病、南方锈病, 中抗大斑病、茎腐病, 感穗腐病、丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区种植, 在穗腐病、丝黑穗病、锈病重发区慎用。	注意苗期防止地老虎、大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
70	玉米	双兴玉 2 号	黔引种 2023 第 101 号	鄂审玉 2015002	华中农业大学、武汉双兴农业科技有限公司	贵州吉丰种业有限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 133.1 天, 比对照贵单 8 号长 0.9 天。8 个试点平均亩产 666.0 千克, 比对照增产 9.2%, 增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 抗纹枯病、丝黑穗病、小斑病和南方锈病, 中抗灰斑病、大斑病和穗腐病, 感茎腐病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎、大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
71	玉米	达美5号	黔引种2023第102号	鄂审玉20220012	十堰市农业科学院、华中农业大学	贵州吉丰种业有限责任公司	2023年引种试验平均生育期133.9天，比对照贵单8号短0.1天。8个试点平均亩产669.4千克，比对照增产9.7%，增产点率100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病和丝黑穗病，抗大斑病、纹枯病、小斑病和南方锈病，中抗灰斑病和穗腐病。	贵阳市、黔东南市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔1900米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
72	玉米	北玉89	黔引种2023第103号	滇审玉米2022001号	云南北玉种子科技有限公司	贵州吉丰种业有限责任公司	2023年引种试验平均生育期132.8天，比对照贵单8号短1.2天。8个试点平均亩产656.8千克，比对照增产7.8%，增产点率100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗丝黑穗病，抗大斑病、玉米纹枯病、小斑病、南方锈病，中抗灰斑病、茎腐病，感穗腐病。	贵阳市、黔东南市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔1900米以下中等以上肥力土壤地区种植，在穗腐病重发区慎用。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。在丝黑穗病高发区慎用。
73	玉米	家吉668	黔引种2023第104号	滇审玉米2022083号	云南家家吉农业科技有限公司	云南德隆农业科技有限公司	2023年引种试验平均生育期131天，与对照贵单8号晚1天；8个试点平均亩产661.8千克，比对照增产5.28%，增产点率87%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病和小斑病、中抗大斑病、穗腐病、茎腐病、纹枯病、丝黑穗病和南方锈病。	贵阳市、黔东南市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔1900米以下中等以上肥力土壤地区。	中高海拔注意防治丝黑穗病。注意防治玉米螟。
74	玉米	家吉118	黔引种2023第105号	滇审玉米2022082号	云南家家吉农业科技有限公司	云南德隆农业科技有限公司	2023年引种试验平均生育期133天，与对照贵单8号晚3天；8个试点平均亩产710.3千克，比对照增产7.2%，增产点率80%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗南方锈病、抗大斑病、小斑病、纹枯病、丝黑穗病，中抗灰斑病、穗腐病和茎腐病。	贵阳市、黔东南市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔1900米以下中等以上肥力土壤地区。	中高海拔注意防治丝黑穗病。注意防治玉米螟。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
75	玉米	谷玉 88	黔引种 2023 第 106 号	滇审玉米 2021102 号	云南鑫禾种业有限公司	云南金瑞种业有限公司	2023 年引种试验平均生长期 128.6 天, 比对照贵单 8 号短 6.8 天, 8 个试点平均亩产 684.4 千克, 比对照增产 0.49%, 增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗茎腐病, 抗灰斑病, 小斑病和南方锈病, 中抗穗腐病和大斑病, 感纹枯病和丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州、安顺、毕节市、六盘水市 1900 米以下中等以上肥力地区。在锈病高发区慎用。	注意苗期防止地老虎、大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。纹枯病和丝黑穗病高发区慎用。
76	玉米	京甜糯 988	黔引种 2023 第 107 号	渝审玉米 20230019	武威兴盛种业有限公司、重庆润农种业有限公司	重庆市重有农业有限公司	2023 年引种试验平均生长期 97.6 天, 比对照黔糯 868 短 2.1 天。7 个试点平均亩产 803.2 千克, 比对照增产 13.26%, 增产点率 85.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗南方锈病, 抗灰斑病、丝黑穗病和小斑病, 中抗纹枯病, 感大斑病和穗腐病, 高感茎腐病。	贵州省鲜食玉米种植区。	注意主要病虫害的防治, 在茎腐病高发区慎用。合理安排播期, 避开极端天气对玉米生长的影响。
77	玉米	晨光 19 号	黔引种 2023 第 108 号	滇审玉米 2022225 号	师宗晨光种业有限责任公司	师宗晨光种业有限责任公司	2023 年引种试验平均生长期 134.5 天, 比对照贵单 8 号长 3.9 天。8 个试点平均亩产 691.8 千克, 比对照增产 6.62%, 增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 抗灰斑病、大斑病、茎腐病、纹枯病和小斑病, 中抗穗腐病、丝黑穗病和南方锈病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎、大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
78	玉米	晨光 188	黔引种 2023 第 109 号	滇审玉米 2022226 号	师宗晨光种业有限责任公司	师宗晨光种业有限责任公司	2023 年引种试验平均生长期 131.9 天, 与对照贵单 8 号长 1.3 天。8 个试点平均亩产 723.2 千克, 比对照增产 11.46%, 增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗南方锈病, 抗茎腐病、纹枯病和小斑病, 中抗灰斑病、大斑病和穗腐病, 感丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎、大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。丝黑穗病高发区慎用。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
79	玉米	焱白玉 1 号	黔引种 2023 第 110 号	滇审玉米 20222074 号	云南粒粒金农业科技有限公司	云南金穗种业公司	2023 年引种试验平均生育期 155.1 天，比对照西抗 18 早熟 1.0 天。7 个试验平均亩产 687.2 千克，比对照增产 2.7%，增产点率 71.4%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗大斑病、小斑病和南方锈病，中抗灰斑病、茎腐病和穗腐病，感纹枯病和丝黑穗病。	毕节市、六盘水市海拔 1400-2200 米中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
80	玉米	文单 919	黔引种 2023 第 111 号	滇审玉米 20222039 号	文山壮族苗族自治州农业科学院	云南文研种苗科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 131.3 天，比对照贵单 8 号长 0.6 天。8 个试点平均亩产 656.0 千克，比对照增产 3.37%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病，抗纹枯病、丝黑穗病、小斑病，中抗灰斑病、大斑病、穗腐病、南方锈病。	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	播种后连续干旱可能影响出苗，应该及时采取措施；适时追肥，及时防治病虫害；对水肥条件要求较高。
81	玉米	星辰 6 号	黔引种 2023 第 112 号	滇审玉米 2022153 号	西昌垦丰农业科技有限公司、云南迈洲农业科技有限公司	云南文研种苗科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 129.1 天，比对照贵单 8 号短 1.5 天。8 个试点平均亩产 679.9 千克，比对照增产 7.13%，增产点率 75%。所有试点未发生倒伏，综合抗病性较强。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗小斑病和南方锈病，中抗灰斑病、穗腐病、茎腐病和纹枯病，感大斑病、丝黑穗病	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。大斑病和丝黑穗病高发区慎用。
82	玉米	雅白玉 89	黔引种 2023 第 113 号	滇审玉米 2021038 号	西双版纳强鑫农业服务有限公司	云南文研种苗科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 131.5 天，比对照贵单 8 号长 0.9 天。8 个试点平均亩产 663.2 千克，比对照增产 4.5%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗灰斑病、茎腐病，抗大斑病、纹枯病、小斑病，中抗穗腐病、南方锈病，感丝黑穗病	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意防止病虫害。丝黑穗病高发区慎用。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
83	玉米	农泽 999	黔引种 2023 第 114 号	桂审玉 2020087 号	广西万禾种业有限公司、云南兆和种业有限公司	云南文研种苗科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 125.8 天，比对照新中玉 801 早熟 0.1 天。8 个试点平均亩产 555.2 千克，比对照增产 2.44%，增产点率 75%。	贵州省植物保护研究所鉴定结果：高抗丝黑穗病、小斑病、抗纹枯病、大斑病、穗腐病、南方锈病和灰斑病。	贵阳市、遵义市、黔东南州、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
84	玉米	云山单 98	黔引种 2023 第 115 号	滇审玉米 2022071 号	蒙自和顺农业科技开发有限公司	云南金瑞种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 152.4 天，比对照西抗 18 早熟 3.7 天。7 个试点平均亩产 782.1 千克，比对照增产 16.88%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗丝黑穗病，抗小斑病、南方锈病、茎腐病，中抗纹枯病、大斑病、穗腐病、感灰斑病。	毕节市、六盘水市海拔 1400-2200 米中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
85	玉米	点谷 41	黔引种 2023 第 116 号	滇审玉米 2022013 号	云南点谷农业科技有限公司	云南点谷农业科技有限公司	2022 年引种试验生育期 134.6 天，比对照贵单 8 号短 0.6 天。8 个试点平均亩产 682.1 千克，比对照贵单 8 号增产 7.14%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗丝黑穗病，抗纹枯病、大斑病、穗腐病、灰斑病、中抗小斑病、南方锈病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	多雨年份注意及时排水并防治穗腐病、小斑病和南方锈病，注意病虫害防治，适时收获。
86	玉米	心农 98	黔引种 2023 第 117 号	滇审玉米 2022095 号	四川农业大学	四川农业大学	2023 年引种试验平均生育期 127.8 天，比对照贵单 8 号短 2.9 天。8 个试点平均亩产 725.6 千克，比对照增产 11.83%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病，抗南方锈病、小斑病和纹枯病，中抗灰斑病、大斑病和丝黑穗病，感穗腐病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。穗腐病高发区慎用。	适时收获，防止霉烂；注意病虫害防治。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
87	玉米	锋玉 201	黔引种 2023 第 118 号	滇审玉米 2022098 号	织金县锋登农业科学研究所	云南织峰种业有限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 130.1 天，比对照贵单 8 号短 0.5 天。8 个试点平均亩产 691.7 千克，比对照增产 8.99%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗灰斑病，抗纹枯病、小斑病，中抗大斑病、茎腐病、丝黑穗病、南方锈病，感穗腐病。	贵州省的贵阳市、安顺市、毕节市、黔西南州、六盘水市海拔 1900 米以下中上等肥力地区。穗腐病高发区慎用。	穗腐病重灾区慎用。
88	玉米	志裕 112	黔引种 2023 第 119 号	滇审玉米 2022186 号	贵州黔农农业发展有限公司	云南织峰种业有限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 156.3 天，比对照西抗 18 晚熟 0.1 天。7 个试点平均亩产 678.9 千克，比对照增产 1.46%，增产点率 57.1%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗穗腐病，抗大斑病、玉米纹枯病、小斑病，中抗灰斑病、茎腐病、南方锈病，感丝黑穗病。	毕节市、六盘水市海拔 1400-2200 米以上肥力土壤地区。丝黑穗病高发区慎用。	丝黑穗病重灾区慎用。
89	玉米	华元玉 277	黔引种 2023 第 120 号	滇审玉米 2022134 号	四川科荟生物科技有限公司、四川华元博冠生物育种有限责任公司	科荟种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 133.1 天，比对照贵单 8 号短 2.3 天。8 个试点平均亩产 730.0 千克，比对照增产 7.18%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、茎腐病、纹枯病、小斑病，南方锈病、中抗大斑病、穗腐病、感丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。在灰斑病、锈病、纹枯病、丝黑穗病高发区慎用。	注意防治丝黑穗病。
90	玉米	N 美 518	黔引种 2023 第 121 号	桂审玉 2020075 号	广西川桂种业有限公司	北京丰度高科种业有限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 114.2 天，比对照正大 808 长 0.7 天。6 个试点平均亩产 569.0 千克，比对照增产 7.73%，增产点率 66.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗丝黑穗病，抗茎腐病、小斑病、南方锈病，中抗大斑病、穗腐病、纹枯病，感灰斑病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、平塘县、罗甸县、望谟县、册亨县、安龙县、贞丰县、兴义市、紫云县、镇宁县、关岭县海拔 800 米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。	灰斑病高发区慎用，注意防治病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
91	玉米	贡香雪糯	黔引种 2023 第122号	桂审玉 2022034号	河池市农业科学研究院 所、广西农业科学院 河池分院	重庆柳渝 农业有限 公司	2023年引种试验平均生育期 102.7天，比对照黔糯868短 3.7天。7个试点平均亩产826.5 千克，比对照增产6.58%，增 产点率100.0%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗 丝黑穗病、抗小斑 病、中抗灰斑病、中抗 中抗穗腐病、中抗 纹枯病、中抗南方 锈病、感大斑病、 高感茎腐病。	贵州省鲜食玉米 种植区。	茎腐病高发区慎用。
92	玉米	鸿玉888	黔引种 2023 第123号	川审玉 20212029	四川鸿鑫种业有限公 司、四川汉唐高科种 业有限公司、湖北康 农种业股份有限公司	贵州遵丰 农业科技 有限责任 公司	2023年引种试验平均生育期 124.1天，比对照新中玉801 早熟1.8天。8个试点平均亩 产565.4千克，比对照增产 4.31%，增产点率75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高 抗茎腐病，抗大斑 病、小斑病、南方 锈病，中抗灰斑 病、穗腐病、纹枯 病、丝黑穗病。	贵阳市、遵义市、 黔东南州、黔南 州、铜仁市、金沙 县海拔1500米以上 下中等以上肥力 土壤地区。	苗期注意蹲苗，防止倒 伏；适时早收；做好病 虫害防治；注意防治枯 纹病、丝黑穗病和玉米 螟。
93	玉米	鸿玉518	黔引种 2023 第124号	川审玉 20196023	仲衍种业股份有限公 司、四川鸿鑫种业有 限公司、湖北康农种 业有限公司、四川昊 明达种业有限公司	贵州遵丰 农业科技 有限责任 公司	2023年引种试验平均生育期 125.1天，比对照新中玉801 早熟0.8天。8个试点平均亩 产615.9千克，比对照增产 13.64%，增产点率87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗 灰斑病、大斑病、 丝黑穗病、小斑 病、南方锈病，中 抗穗腐病、茎腐 病、纹枯病。	贵阳市、遵义市、 黔东南州、黔南 州、铜仁市、金沙 县海拔1500米以上 下中等以上肥力 土壤地区。	苗期注意蹲苗，防止倒 伏；适时早收；做好病 虫害防治；注意防治枯 纹病、丝黑穗病和玉米 螟。
94	玉米	仲单1号	黔引种 2023 第125号	川审玉 20206003	仲衍种业股份有限公 司、四川鸿鑫种业有 限公司、四川裕丰种 业有限公司	贵州遵丰 农业科技 有限责任 公司	2023年引种试验平均生育期 124天，比对照新中玉801早 熟1.9天。8个试点平均亩产 564.0千克，比对照增产 4.06%，增产点率75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗 大斑病、茎腐病、 表、小斑病，中抗 灰斑病、穗腐病、 纹枯病、南方锈 病，感丝黑穗病。	贵阳市、遵义市、 黔东南州、黔南 州、铜仁市、金沙 县海拔1500米以上 下中等以上肥力 土壤地区。	苗期注意蹲苗，防止倒 伏；适时早收；做好病 虫害防治；注意防治枯 纹病、丝黑穗病和玉米 螟。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
95	玉米	内玉 9018	黔引种 2023 第 126 号	川审玉 20220008	四川省内江市农业科学院、临泽县恒源农业科技发展有限公司、四川云海农业科技有限公司、内江丰粮农业科技有限公司	四川云海农业科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 124.6 天，比对照新中玉 801 短 1.3 天。8 个试点平均亩产量 618.4 千克，比对照新中玉 801 增产 14.1%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病，抗灰斑病、大斑病、小斑病、南方锈病，中抗穗腐病、纹枯病、丝黑穗病。	贵阳市、遵义市、黔东南州、黔南州、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意防治灰斑病，苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，病虫害防治根据当地农业部门病虫预报进行，预防为主，施肥时注意氮磷钾的合理施用。
96	玉米	鼎玉 339	黔引种 2023 第 127 号	桂审玉 2016006 号	广西百香高科种业有限公司	四川云海农业科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 114.7 天，比对照正大 808 长 1.2 天。6 个试点平均亩产量 551.8 千克，比对照正大 808 增产 4.46%，增产点率 66.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病，抗纹枯病、小斑病、南方锈病，中抗灰斑病、大斑病、穗腐病，感丝黑穗病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、平塘县、罗甸县、望谟县、册亨县、安龙县、贞丰县、兴义市、紫云县、镇宁县、关岭县海拔 800 米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。	注意防治灰斑病，苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，病虫害防治根据当地农业部门病虫预报进行，预防为主，施肥时注意氮磷钾的合理施用。
97	玉米	中垦玉 77	黔引种 2023 第 128 号	滇审玉米 20222236 号	甘肃农垦良种有限责任公司	甘肃农垦良种有限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 130.1 天，比对照贵单 8 号短 0.5 天。8 个试点平均亩产 682.0 千克，比对照增产 5.12%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗穗腐病、茎腐病，抗纹枯病、丝黑穗病、小斑病，中抗灰斑病、南方锈病，感大斑病。	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。大斑病重发区慎用。
98	玉米	昊单 653	黔引种 2023 第 129 号	川审玉 20220012	四川昊华城农业科技有限公司、四川昊明达种业有限公司	四川台沃种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 131.4 天，比对照贵单 8 号短 4.0 天。8 个试点平均亩产 692.6 千克，比对照 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗丝黑穗病、小斑病、南方锈病，中抗灰斑病、大斑病、穗腐病、茎腐病，感纹枯病。	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意防治穗腐病、灰斑病、玉米螟等病虫害，后期主要防倒伏。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
99	玉米	秋硕玉4号	黔引种2023第130号	滇审玉米2022239号	昆明地沃农业科技有 限公司	云南宣晟 种业有 限公司	2023年引种试验平均生育期114.7天，比对照正大808长1.2天。6个试点平均亩产557.7千克，比对照增产5.58%，增产点率66.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗南方锈病、抗灰斑病、小斑病，中抗大斑病、穗腐病、纹枯病、丝黑穗病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、望塘县、罗甸县、安龙县、册亨县、兴义市、贞丰县、义龙县、紫云县、镇宁县、关岭县海拔800米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。	注意防治蚜虫、螟虫危害。
100	玉米	地沃10号	黔引种2023第131号	滇审玉米2022177号	昆明地沃农业科技有 限公司	云南宣晟 种业有 限公司	2023年引种试验平均生育期153天，比对照西抗18早3.1天。7个试点平均亩产734.3千克，比对照增产9.74%，增产点率85.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病、丝黑穗病，抗小斑病，抗大斑病，抗灰斑病、大斑病、穗腐病、纹枯病、南方锈病。	六盘水市、毕节市海拔1400~2200米中等以上肥力土壤地区。锈病高发区慎用。	注意防治地下害虫，后期加强对蚜虫的防治。
101	玉米	群玉210	黔引种2023第132号	川审玉米20222001	四川昊明达种业有 限公司、广西壮族自 治区农业科学院玉米研 究所、四川昊华城农 业科技有限公司、四 川群策种业有 限公司	四川群策 种业有 限公司	2023引种试验平均生育期124.6天，比对照新中玉801早1.3天。8个试点平均亩产578.0千克，比对照增产6.65%，增产点率75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病，抗小斑病、南方锈病，中抗灰斑病、大斑病、穗腐病、纹枯病、丝黑穗病。	贵阳市、遵义市、黔东南州、黔南州、铜仁市、金沙县海拔1500米以下中等以上肥力土壤地区。	苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，施肥时注意氮、磷、钾的合理施用。
102	玉米	群玉一号	黔引种2023第133号	川审玉米20222043	四川群策种业有 限公司、四川昊华城农 业科技有限公司	四川群策 种业有 限公司	2023引种试验平均生育期130.1天，比对照贵单8号短0.5天。8个试点平均亩产711.1千克，比对照增产9.59%，增产点率87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病、南方锈病，抗灰斑病、大斑病、丝黑穗病、小斑病，中抗穗腐病、纹枯病。	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔1900米以下中等以上肥力土壤地区。	苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，施肥时注意氮、磷、钾的合理施用。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
103	玉米	钻玉一号	黔引种 2023 第 134 号	川审玉 20202061	四川昊华城农业科技 有限公司、四川昊明 达种业有限公司	四川群策 业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 132.3 天，比对照贵单 8 号长 1.6 天。8 个试点平均亩产 691.07 千克，比对照增产 6.51%，增产点率 62.5%。	2023 年度贵州省植物保护鉴定：抗大斑病、小斑病、茎腐病，中抗灰斑病、穗腐病、纹枯病、丝黑穗病。	贵阳市、黔东南州市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等肥力土壤区。	注意防治灰斑病、穗腐病、纹枯病、丝黑穗病等病害。在此类病害高发区慎用。防治好病虫害，苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟。
104	玉米	高康 313	黔引种 2023 第 135 号	川审玉 20222023	四川康农高科种业有限公司、湖北康农种业股份有限公司	四川高地 业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 124.5 天，比对照新中玉 801 早熟 1.4 天。8 个试点平均亩产 585.9 千克，比对照增产 8.1%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗茎腐病、纹枯病、小斑病，中抗灰斑病、大斑病、穗腐病、南方锈病，感丝黑穗病。	贵阳市、遵义市、黔东南州市、黔南州市、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以上肥力土壤地区。	综合防治病虫害，注意防治丝黑穗病。
105	玉米	会玉 2689	黔引种 2023 第 136 号	滇审玉米 2021002 号	云南会丰种业有限公司 任公司农业开发研究所	云南会丰 种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 131.5 天，比对照贵单 8 号长 0.9 天。8 个试点平均亩产 714.1 千克，比对照增产 12.52%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、纹枯病、小斑病，中抗大斑病、穗腐病、茎腐病和南方锈病，感丝黑穗病。	贵阳市、黔东南州市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等肥力土壤地区。	注意苗期管理，注意防治玉米螟。
106	玉米	瀚玉 999	黔引种 2023 第 137 号	桂审玉 2022070 号	唐炬平、王姣姣、吴商朝、刘垂深	广西瀚林 农业科技有限公司	2023 年贵州省东部组引种试验平均生育期 125.3 天，比对照新中玉 801 早熟 0.6 天。8 个试点平均亩产 566.2 千克，比对照增产 4.47%，增产点率 75%。 2023 年贵州省低热河谷组引种试验平均生育期 114.2 天，比对照正大 808 长 0.7 天。6 个试点平均亩产 568.4 千克，比对照增产 7.61%，增产点率 66.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗茎腐病、小斑病、丝黑穗病和南方锈病，中抗灰斑病、大斑病、穗腐病和纹枯病。	贵阳市、遵义市、黔东南州市、黔南州市、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以下和望谟县、册亨县、安龙县、贞丰县、兴义市、紫云县、镇宁县、关岭县海拔 800 米以下低热河谷区的中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
107	玉米	先凯 868	黔引种 2023 第 138 号	桂审玉 2023055 号	广西农业职业技术大学、西双版纳种业有限公司	西双版纳种业纳有限公司	2023 年引种试验平均生育期 113.8 天, 比对照正大 808 长 0.3 天。6 个试点平均亩产 558.1 千克, 比对照增产 5.67%, 增产点率 83.3%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗灰斑病、茎腐病、丝黑穗病, 抗纹枯病、小斑病, 中抗大斑病、穗腐病、南方锈病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、罗甸县、册亨县、望谟县、贞丰县、龙里县、紫云县、义市、关岭县海拨 800 米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。	不宜超过适宜密度, 注意草地贪夜蛾防治
108	玉米	先凯 212	黔引种 2023 第 139 号	桂审玉 2023002 号	广西万禾种业有限公司、广西先凯农业科技有限公司	广西皓凯生物科技有限公司	2023 年引种试验平均生育期 115.0 天, 比对照正大 808 长 1.5 天。6 个试点平均亩产 571.2 千克, 比对照增产 8.14%, 增产点率 100%。所有试点未发生倒伏, 综合抗病性较强。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 抗灰斑病、大斑病、玉米纹枯病、丝黑穗病、小斑病, 中抗茎腐病、穗腐病、南方锈病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、罗甸县、册亨县、望谟县、贞丰县、龙里县、紫云县、义市、关岭县海拨 800 米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。	不宜超过适宜密度, 注意草地贪夜蛾防治
109	玉米	易金 233	黔引种 2023 第 140 号	桂审玉 2021018 号	东方正大种子有限公司	广西恒茂农业科技农业有限公司	2022 年引种试验平均生育期 120.3 天, 比对照正大 808 长 0.5 天。6 个试点平均亩产 552.3 千克, 比对照增产 0.58%, 增产点率 66.7%。综合倒伏率 1.5%, 综合抗病性较强。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗小斑病、丝黑穗病, 抗大斑病、穗腐病、南方锈病、灰斑病, 中抗玉米纹枯病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、罗甸县、册亨县、望谟县、贞丰县、龙里县、紫云县、义市、关岭县海拨 800 米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区	注意防治玉米螟, 草地贪夜蛾等。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
110	玉米	易金 235	黔引种 2023 第 141 号	桂审玉 2021009 号	东方正大种子有限公司	广西恒茂农业科技农业有限公司	2022 年引种试验平均生育期 120.0 天，比对照正大 808 长 0.5 天。6 个试点平均亩产 568.5 千克，比对照增产 3.53%，增产点率 83.3%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗灰斑病、大斑病、小斑病、丝黑穗病，抗穗腐病、南方锈病，中抗玉米纹枯病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、平塘县、罗甸县、望谟县、册亨县、安龙县、贞丰县、兴义市、紫云县、镇宁县、关岭县海拔 800 米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。	注意防治玉米螟，草地贪夜蛾等。
111	玉米	文丰 191	黔引种 2023 第 142 号	桂审玉 2022059 号	广西先迪农业科技有限公司、广西文丰农业有限公司	广西先迪农业科技农业有限公司、广西文丰农业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 114.3 天，比对照正大 808 长 0.8 天。6 个试点平均亩产 568.1 千克，比对照增产 7.55%，增产点率 83.3%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：高抗茎腐病，抗灰斑病、小斑病、南方锈病，中抗大斑病、纹枯病，感穗腐病、丝黑穗病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、平塘县、罗甸县、望谟县、册亨县、安龙县、贞丰县、兴义市、紫云县、镇宁县、关岭县海拔 800 米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。	注意防治草地贪夜蛾，苗期注意防治地老虎等地下害虫，大喇叭期注意防治玉米螟等病虫害，玉米抽穗前防治大小斑病。
112	玉米	文丰 618	黔引种 2023 第 143 号	桂审玉 2023006 号	广西文丰农业有限公司	广西文丰农业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 114.7 天，比对照正大 808 长 1.2 天。6 个试点平均亩产 571.0 千克，比对照增产 8.11%，增产点率 66.7%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定综合评价：高抗茎腐病，抗灰斑病、小斑病、南方锈病，中抗大斑病、纹枯病，感穗腐病、丝黑穗病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、平塘县、罗甸县、望谟县、册亨县、安龙县、贞丰县、兴义市、紫云县、镇宁县、关岭县海拔 800 米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。	苗期注意防治地老虎等地下害虫；大喇叭期等注意防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
113	玉米	先迪美娜	黔引种 2023 第144号	渝审玉 20220032	广西先迪农业科技有 限公司	南京沃 种业有 限公司	2023年引种试验平均生育期 96.9天,比黔糯868短2.9天。 7个试点平均亩产851.0千克, 比对照增产20%,增产点率 85.7%。	经贵州省植物保 护研究所鉴定:高 抗南方锈病、丝黑 穗病,抗小斑病, 中抗纹枯病、灰斑 病,感穗腐病,高 感大斑病、茎腐 病。	贵州省鲜食玉米 种植区	注意大、小斑病、纹枯 病和玉米螟等病虫害 防治。
114	玉米	洱之玉 917	黔引种 2023 第145号	滇审玉米 2022248号	云南良禾种业有限公 司	云南金鼎 禾朴农有 限公司	2022年引种试验平均生育期 137.4天,比对照贵单8号长 3.0天,8个试点平均亩产674.1 千克,比对照贵单8号增产 7.0%。增产点率87.5%。	经贵州省植物保 护研究所鉴定:高 抗丝黑穗病抗灰 斑病、纹枯病、大 斑病,中抗穗腐 病、小斑病、南方 锈病。	贵阳市、黔西南 州、安顺市、毕 节市、六盘水市海 拔1900米以下中 等以上肥力土壤地 区	多雨年份注意及时排 水并防治穗腐病、小斑 病和南方锈病。
115	玉米	汉甜309	黔引种 2023 第146号	鄂审玉 20200029	湖北省种子集团有限 公司	武汉川禾 农业科技 有限公司	2023年引种试验平均生育期 98.9天,比对照黔糯868短0.9 天。7个试点平均亩产754.8 千克,比对照黔糯868增产 6.44%,增产点率71.4%。	经贵州省植物保 护研究所抗病性鉴 定:抗小斑病、南 方锈病,中抗灰斑 病、茎腐病,感大 斑病、穗腐病、纹 枯病、丝黑穗病。	贵州省鲜食玉米 种植区	穗腐病高发区慎用。
116	玉米	鑫禾699	黔引种 2023 第147号	滇审玉米 2022127号	云南鑫禾种业有限公 司	云南鑫禾 种业有 限公司	2023年引种试验平均生育期 131.4天,比对照贵单8号长 0.8天。8个试点平均亩产687.7 千克,比对照增产8.37%,增 产点率75%。	经贵州省植物保 护研究所鉴定结 果为:高抗小斑 病,抗纹枯病,中 抗灰斑病、大斑 病、穗腐病、茎 腐病、丝黑穗病、南 方锈病。	贵阳市、黔西南 州、安顺市、毕 节市、六盘水市海 拔1900米以下中 等以上肥力土壤地 区。	在玉米雌雄分化期禁 止用高浓度甲维盐杀 虫剂。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
117	玉米	鑫禾 789	黔引种 2023 第 148 号	滇审玉米 20222126 号	云南鑫禾种业有限公司、红河金诚农业科技有限公司	云南鑫禾种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 130.3 天，比对照贵单 8 号短 0.4 天。8 个试点平均亩产 701.3 千克，比对照增产 10.51%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定结果：高抗茎腐病，抗灰斑病、穗腐病、纹枯病、小斑病，中抗大斑病、南方锈病，感丝黑穗病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。在锈病、丝黑穗病高发区慎用。	在丝黑穗病高发区慎用。
118	玉米	金诚玉 6 号	黔引种 2023 第 149 号	滇审玉米 20222119 号	云南鑫禾种业有限公司、红河金诚农业科技有限公司	云南鑫禾种业有限公司	2022 年引种试验平均生育期 135.4 天，比对照贵单 8 号长 0.1 天。8 个试点平均亩产 697.9 千克，比对照贵单 8 号增产 9.62%。增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗丝黑穗病，抗玉米纹枯病、大斑病、南方锈病，中抗穗腐病、小斑病、灰斑病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。在锈病、纹枯病高发区慎用。	在玉米雌雄分化期禁止用高浓度甲维盐杀虫剂。
119	玉米	红麟 9 号	黔引种 2023 第 150 号	滇审玉米 20222020 号	红河三沐种业有限公司	红河三沐种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 134.3 天，比对照贵单 8 号短 1.1 天。8 个试点平均亩产 694.09 千克，比对照增产 1.9%，增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗灰斑病、茎腐病、纹枯病、丝黑穗病和小斑病，抗大斑病、南方锈病，中抗穗腐病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防治草地贪夜蛾、地老虎，大喇叭口期防治草地贪夜蛾、玉米螟等病虫害。
120	玉米	DS993	黔引种 2023 第 151 号	川审玉 20222036	四川鼎盛和种业有限公司、四川奥力星农业科技有限公司、成都天府农作物研究所	四川鼎盛和种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 124.6 天，比对照新中玉 801 早熟 1.3 天。8 个试点平均亩产 580.3 千克，比对照增产 7.08%，增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病、大斑病、纹枯病、小斑病、南方锈病，中抗穗腐病、茎腐病，感丝黑穗病。	贵阳市、遵义市、黔东南州市、黔南州市、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以上中等以上肥力土壤地区。	注意综合防治病虫害

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
121	玉米	富强 1 号	黔引种 2023 第 152 号	滇审玉米 2022099 号	师宗县葵山岭丰种子经营部	贵州大宇种业有限责任公司	2022 年引种试验平均生育期 134 天，对照贵单 8 号短 0.4 天，8 个试点平均亩产 637.9 千克，比对照贵单 8 号增产 1.26%，增产点 75.0%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗丝黑穗病，抗灰斑病、大斑病、南方锈病和穗腐病，中抗小斑病和纹枯病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意防治病虫害
122	玉米	鲁玉 316	黔引种 2023 第 153 号	滇审玉米 2022029 号	云南鲁丰种业有限公司	贵州大宇种业有限责任公司	2022 年引种试验平均生育期 136.0 天，比对照贵单 8 号长 1.6 天。8 个试点平均亩产 679.7 千克，比对照贵单 8 号增产 7.89%，增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗丝黑穗病，抗玉米纹枯病、大斑病、穗腐病、小斑病、南方锈病和灰斑病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	播种时注意防治地下害虫，生长期注意防治草地贪夜蛾、粘虫、蚜虫。
123	玉米	鲁玉 318	黔引种 2023 第 154 号	滇审玉米 2022030 号	云南鲁丰种业有限公司	贵州大宇种业有限责任公司	2022 年引种试验平均生育期 134.8 天，比对照贵单 8 号长 0.4 天。8 个试点平均亩产 653.5 千克，比对照贵单 8 号增产 3.74%，增产率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗丝黑穗病，抗灰斑病、纹枯病、大斑病、穗腐病，中抗小斑病、南方锈病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等肥力土壤地区。	播种时注意防治地下害虫，生长期注意防治草地贪夜蛾、粘虫、蚜虫。
124	玉米	迪玉 403	黔引种 2023 第 155 号	滇审玉米 2021082 号	云南迪玉种业有限公司	云南迪玉种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 130.6 天，比对照贵单 8 号短 1.6 天。8 个试点平均亩产 693.6kg，比对照贵单 8 号增产 7.94%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗纹枯病、丝黑穗病、小斑病、锈病、茎腐病，中抗大斑病、穗腐病、灰斑病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区，在锈病高发区慎用，湿热区不宜种植。	在锈病高发区慎用，湿热区不宜种植。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
125	玉米	迪玉 503	黔引种 2023 第 156 号	滇审玉米 2021083 号	云南迪玉种业有限公司	云南迪玉种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 131.8 天，比对照品种贵单 8 号长 2.8 天。8 个试点平均亩产 676.0 千克，比对照贵单 8 号增产 5.19%，增产点率 100%	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病，抗丝黑穗病，小斑病，中抗纹枯病，锈病，大斑病，穗腐病，灰斑病	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等肥力土壤地区。在灰斑病、锈病、纹枯病高发区慎用，湿热区不宜种植。	在灰斑病、锈病、纹枯病高发区慎用，湿热区不宜种植。
126	玉米	长虹 1 号	黔引种 2023 第 157 号	滇审玉米 2022078	保山市冲级种业有限公司	保山市冲级种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 132 天，比对照贵单 8 号长 1.4 天。8 个试点平均亩产 650.7 千克，比对照增产 2.54%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗灰斑病茎腐病、纹枯病、小斑病，中抗大斑病、穗腐病、丝黑穗病、南方锈病。	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等肥力土壤地区。	播种过程中请选择中等肥力地块种植，避免洼地、积水地块、肥力低下的地块种植。
127	玉米	长虹 3 号	黔引种 2023 第 158 号	滇审玉米 2021058	保山市冲级种业有限公司	保山市冲级种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 131.9 天，比对照贵单 8 号长 1.3 天。8 个试点平均亩产 647.7 千克，比对照增产 2.07%，增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗小斑病、南方锈病，中抗灰斑病、大斑病、茎腐病、纹枯病、丝黑穗病，感穗腐病。	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等肥力土壤地区。在锈病和纹枯病高发区慎用。	播种过程中请选择中等肥力地块种植，避免洼地、积水地块、肥力低下的地块种植。
128	玉米	宜单 1628	黔引种 2023 第 159 号	鄂审玉米 2019017	宜昌市农业科学研究院	贵州合力农业科技有限公司	2022 年引种试验平均生育期 136.3 天，比对照贵单 8 号短 1 天。8 个试点平均亩产 698.3 千克，比对照贵单 8 号增产 9.68%，增产点率 85.7%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定：高抗灰斑病、丝黑穗病，抗大斑病、小斑病，中抗穗腐病、纹枯病、南方锈病。	贵阳市、黔东南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等肥力土壤地区。	注意防治大斑病、灰斑病、纹枯病、茎腐病和地老虎、玉米螟、草地贪夜蛾等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
129	玉米	成单 720	黔引种 2023 第 160 号	川审玉 20212026	四川省农业科学院作物研究所	四川天字种业有限责任公司	2023 年引种试验平均生育期 123.8 天, 比对照新中玉 801 短 2.1 天。8 个试点平均亩产 597.2 千克, 比对照增产 10.18%, 增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 抗小斑病、丝黑穗病, 中抗大斑病、穗腐病、茎腐病、纹枯病和南方锈病, 感灰斑病。	贵阳市、遵义市、黔南州、铜仁市、金沙县海拔 1500 米以上中等以上肥力土壤地区。	注意苗期防止地老虎、大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
130	玉米	美谷 666	黔引种 2023 第 161 号	鄂审玉 20216012	湖北康农种业股份有限公司	湖北康农种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 129.9 天, 比对照贵单 8 号短 0.8 天, 亩产 680.2 千克, 比对照贵单 8 号增产 4.84%, 增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定: 抗大斑病、丝黑穗病、小斑病、南方锈病, 中抗灰斑病、穗腐病、茎腐病、纹枯病。	贵阳市、黔西市、毕节市、安顺市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意防治灰斑病、穗腐病、茎腐病和地老虎、玉米螟等病虫害。
131	玉米	康恩玉 1 号	黔引种 2023 第 162 号	鄂审玉 20226014	湖北康农种业股份有限公司	湖北康农种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 131.1 天, 比对照贵单 8 号长 0.5 天, 亩产 675.9 千克, 比对照贵单 8 号增产 4.17%, 增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定: 高抗茎腐病, 丝黑穗病, 抗灰斑病、大斑病、小斑病, 中抗穗腐病、南方锈病。	贵阳市、黔西市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意防治灰斑病、穗腐病、茎腐病和地老虎、玉米螟等病虫害。
132	玉米	黄白玉 1 号	黔引种 2023 第 163 号	鄂审玉 20226016	湖北康农种业股份有限公司	湖北康农种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 131.9 天, 比对照贵单 8 号长 1.3 天, 亩产 673.4 千克, 比对照贵单 8 号增产 3.78%, 增产点率 75%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定: 高抗茎腐病, 抗灰斑病、大斑病、丝黑穗病、小斑病、南方锈病, 中抗穗腐病、纹枯病。	贵阳市、黔西市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意防治灰斑病、穗腐病、茎腐病和地老虎、玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
133	玉米	美谷 688	黔引种 2023 第 164 号	鄂审玉 20226013	湖北康农种业股份有限公司	湖北康农种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 129 天，比对照贵单 8 号短 1.6 天，亩产 698.83 千克，比对照贵单 8 号增产 7.71%，增产点率 75%	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定：高抗灰斑病、茎腐病、抗灰斑病、茎腐病、小斑病、南方锈病，中抗大斑病，穗腐病，感丝黑穗病。	贵阳市、黔东南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中壤以上肥力土壤地区。	注意防治灰斑病、穗腐病、茎腐病和地老虎、玉米螟等病虫害。
134	玉米	富农玉 6 号	黔引种 2023 第 165 号	鄂审玉 2018016	湖北康农种业股份有限公司	湖北康农种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 129.8 天，比对照贵单 8 号短 0.9 天，亩产 659.3 千克，比对照贵单 8 号增产 1.62%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定：高抗丝黑穗病，中抗穗腐病、纹枯病，抗灰斑病、大斑病、茎腐病、小斑病、南方锈病。	贵阳市、黔东南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中壤以上肥力土壤地区。	注意防治灰斑病、穗腐病、茎腐病和地老虎、玉米螟等病虫害。
135	玉米	美谷 333	黔引种 2023 第 166 号	鄂审玉 20206009	湖北康农种业股份有限公司、宜昌市农业科学研究院	湖北康农种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 130.4 天，比对照贵单 8 号短 0.3 天，平均亩产 673.2 千克，比对照贵单 8 号增产 3.76%，增产点率 75.0%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定：抗灰斑病、丝黑穗病、小斑病，中抗大斑病、穗腐病、茎腐病、纹枯病，南方锈病。	贵阳市、黔东南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中壤以上肥力土壤地区。	注意防治灰斑病、穗腐病、茎腐病和地老虎、玉米螟等病虫害。
136	玉米	尚谷 888	黔引种 2023 第 167 号	鄂审玉 20226015	湖北康农种业股份有限公司	湖北康农种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 131.3 天，比对照贵单 8 号长 0.6 天，亩产 693.8 千克，比对照贵单 8 号增产 6.93%，增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定：高抗灰斑病、茎腐病、茎腐病、小斑病，抗大斑病、南方锈病，中抗穗腐病、纹枯病，感丝黑穗病。	贵阳市、黔东南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中壤以上肥力土壤地区。	注意防治灰斑病、穗腐病、茎腐病和地老虎、玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
137	玉米	美谷 555	黔引种 2023 第 168 号	鄂审玉 20206007	湖北康农种业股份有限公司	湖北康农种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 127.8 天，比对照贵单 8 号短 2.9 天，亩产 653.38 千克，比对照贵单 8 号增产 0.7%，增产点率 87.5%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定：高抗丝黑穗病，抗大斑病、茎腐病、小斑病，中抗灰斑病、穗腐病、纹枯病、南方锈病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以上中等肥力土壤地区。	注意防治灰斑病、穗腐病、茎腐病和地老虎、玉米螟等病虫害。
138	玉米	银谷 555	黔引种 2023 第 169 号	鄂审玉 20206008	湖北康农种业股份有限公司	湖北康农种业股份有限公司	2023 年引种试验平均生育期 131.5 天，比对照贵单 8 号长 0.9 天，亩产 714.2 千克，比对照贵单 8 号增产 10.07%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所抗病性鉴定：高抗茎腐病、丝黑穗病，抗灰斑病、大斑病、小斑病，中抗穗腐病、纹枯病，南方锈病。	贵阳市、黔西南州市、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以上中等肥力土壤地区。	注意防治灰斑病、穗腐病、茎腐病和地老虎、玉米螟等病虫害。
139	玉米	桂单 919	黔引种 2023 第 170 号	桂审玉 2022060 号	广西壮族自治区农业科学院、广西兆和种业股份有限公司	广西兆和种业公司	2023 年引种试验平均生育期 114.3 天，比对照正大 808 长 0.8 天。6 个试点平均亩产 544.0 千克，比对照增产 2.98%，增产点率 66.7%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病，抗灰斑病、丝黑穗病、小斑病，中抗大斑病、茎腐病、纹枯病、南方锈病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、塘县、罗甸县、望谟县、册亨县、龙义县、紫云县、镇宁县、关岭县海拔 800 米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。注意防治大斑病、轮枝镰孢茎腐病。	注意抗旱，及时防治病虫害，锈病高发区慎用，成熟后及时收获。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
140	玉米	兆玉 300	黔引种 2023 第 171 号	桂审玉 20222061 号	广西兆和种业有限公司	广西兆和种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 113.8 天，比对照正大 808 长 0.3 天。6 个试点平均亩产 552.73 千克，比对照增产 4.65%，增产点率 83.3%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗纹枯病、小斑病、南方锈病，中抗灰斑病、大斑病、穗腐病、茎腐病，感丝黑穗病。	贵州省三都县、荔波县、独山县、平塘县、罗甸县、望谟县、册亨县、安龙县、贞丰县、兴义市、紫云县、镇宁县、关岭县海拔 800 米以下低热河谷区中等以上肥力土壤地区。	注意抗旱，及时防治病虫害，纹枯病、丝黑穗病高发区慎用，成熟后及时收获。
141	玉米	山谷 19	黔引种 2023 第 172 号	滇审玉米 2022054 号	云南滇都种业有限公司	云南滇都种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 156.7 天，比对照西抗 18 晚 0.6 天。7 个试点平均亩产 666.2 千克，比对照增产-0.43%，增产点率 57.1%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗茎腐病、灰斑病、大斑病，中抗穗腐病、小斑病、南方锈病，感纹枯病、丝黑穗病。	毕节市、六盘水市海拔 1500-2200 米中等以上肥力土壤地区。丝黑穗病高发区慎用。	纹枯病、丝黑穗病高发区慎用。
142	玉米	辰瑞 99	黔引种 2023 第 173 号	20222067 号	云南辰瑞种子有限公司	云南滇都种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 153.9 天，比对照西抗 18 晚 2.3 天。7 个试点平均亩产 690.1 千克，比对照增产 3.05%，增产点率 71.4%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：高抗茎腐病、丝黑穗病，抗纹枯病、小斑病、南方锈病、灰斑病、大斑病，中抗穗腐病。	毕节市、六盘水市海拔 1500-2200 米中等以上肥力土壤地区。丝黑穗病高发区慎用。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。
143	玉米	辰瑞 88	黔引种 2023 第 174 号	滇审玉米 20222068 号	云南辰瑞种子有限公司	云南滇都种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 157.3 天，比对照西抗 18 晚 1.1 天。7 个试点平均亩产 746.63 千克，比对照增产 11.58%，增产点率 100%。	经贵州省植物保护研究所鉴定：抗茎腐病、纹枯病、小斑病、南方锈病，中抗灰斑病、大斑病、穗腐病，感丝黑穗病。	毕节市、六盘水市海拔 1500-2200 米中等以上肥力土壤地区。丝黑穗病高发区慎用。	注意苗期防止地老虎，大喇叭口期防治玉米螟等病虫害。

序号	作物	品种名称	引种编号	审定编号	选育者	引种者	适应性试验结果	抗病性鉴定结果	适宜种植区域	风险提示
144	玉米	盛和 1586	黔引种 2023 第 175 号	滇审玉米 2022109 号	云南天种业有限公司	云南天种业有限公司	2023 年引种试验平均生育期 133.8 天, 比对照贵单 8 号短 1.6 天。8 个试点平均亩产 694.3 千克, 比对照增产 1.93%, 增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 抗纹枯病、灰斑病、大斑病、丝黑穗病、小斑病, 中抗穗腐病、茎腐病、南方锈病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。在纹枯病、锈病高发区慎用。	避免洼地、积水地块种植
145	玉米	富玉 2 号	黔引种 2023 第 176 号	滇审玉米 2019014 号	丘北富玉农业科技开发有限公司	云南绿晶种业公司	2022 年贵州省引种试验平均生育期 134.4 天, 比对照贵单 8 号短 0.9 天。8 个试点平均亩产 640.9 千克, 比对照增产 0.66%, 增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗丝黑穗病, 抗大斑病、小斑病、灰斑病、穗腐病, 中抗纹枯病、南方锈病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意防治纹枯病, 南方锈病和地老虎、玉米螟、草地贪夜蛾等病虫害。
146	玉米	特研玉 998	黔引种 2023 第 177 号	川审玉 20202055	绵阳市特研种业有限责任公司、甘肃五谷种业有限公司、三台县大圣玉米研究所	绵阳市特研种业有限责任公司	2022 年贵州省引种试验平均生育期 134.1 天, 比对照贵单 8 号短 1.1 天。8 个试点平均亩产 653.9 千克, 比对照贵单 8 号增产 2.7%。增产点率 62.5%。	经贵州省植物保护研究所鉴定: 高抗大斑病, 抗丝黑穗病、小斑病、南方锈病, 中抗纹枯病、穗腐病、灰斑病。	贵阳市、黔西南州、安顺市、毕节市、六盘水市海拔 1900 米以下中等以上肥力土壤地区。	注意加强以螟虫、蚜虫为主的病虫害防治