

贵州省农作物技术推广总站文件

黔农技发〔2020〕10号

关于抓紧做好水稻倒春寒防御的紧急通知

全省各级农技站：

今年我省倒春寒发生较频繁，前期已有几次发生，近期根据贵州气象台统计与预测，4月下旬至5月上中旬面临大范围的降温，尤其是4月下旬，与常年同期相比全省各地平均气温偏低2~4℃，其中毕节市大部、六盘水市北部日平均温度为8~12℃；黔东南州大部、六盘水市东部、黔南州南部、安顺中南部、黔东南州东部及南部、铜仁市大部、遵义市北部及赤水市日平均温度为15~19℃；其余地区日平均温度为12~15℃，5月上旬后期、中旬、下旬有三次弱降温天气过程。其中，5月上旬全省平均气温较常年偏低1~2℃。倒春寒的发生对现阶段水稻育秧非常不利，各别地区已出现烂种烂秧现象，各地农技站必须立即行动起来，抓紧指导农民搞好水稻育秧与直播稻管理，防御倒春寒危害，确保育好秧育壮秧，保证稻田满栽。防御措施上要根据全省不同稻区不同情况进行分类指导，已播种的旱育秧和湿润育秧，务必盖好塑料薄膜或无纺布防低温，湿润育秧方式的可适当淹水，淹水深度不宜淹过秧苗，初晴后排水，薄膜覆盖的温度转高后要注意揭

膜防高温烧苗；采用两段育秧方式已寄插的秧区，需提高淹水深度，淹水深度不宜淹过秧苗，初晴后排至浅水；采取直播稻的稻区，根据播种情况以水调温，刚直播稻田一般可以淹水3~4天，待出芽时排水，已长新芽的需夜间淹水、白天排水，已长出真叶的稻田可适当淹水，淹水深度不宜淹过秧苗，初晴后排至浅水。

对已出现烂种、烂芽、烂秧的地区，要根据烂种烂秧程度进行防御。烂种烂秧程度重的需及时补播，要根据不同稻区和不同生产方式进行选用品种，温凉与温和移栽稻区宜选择生育期较短的水稻品种，推荐选择泰优390、香早优2017、M两优152等早熟杂交水稻品种，可选择早育秧或湿润育秧方式，播种后务必采用无纺布或塑料薄膜覆盖，搞好秧床管理；在水源条件好的温热稻区可采用直播生产方式进行补救，适宜直播稻应用的品种有宜香优2115、宜香4245、野香优莉丝、C两优华占、渝香203、宜香1979等抗性强的优质稻品种，适宜直播稻播种时间为4月28日-5月10日。烂种烂秧程度较轻的可及时喷药防治挽救，配方为：3%噻霉酮水分散粒剂（细刹）1500倍+30%甲霜·噁霉灵水剂（瑞苗清）1800倍+0.136%赤·吲乙·芸苔可湿性粉剂（碧护）7500倍+助剂安融乐5000倍，秧苗喷雾，1亩秧田3桶水，连用两次，间隔5-7天，并按前述方法进行水分管理。



贵州省农作物技术推广总站

2020年4月23日印发

共印5份